Oecon.
1116 x

Econ.

1116 X

Siegel

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Seinen hochgeschätzten, pomologischen

Freunden und Pflaumen-Liebhabern

widmet

mit innigster Verehrung und Hochachtung

dieses Heft der Pflaumen

der Verfasser.

Econ.

iii/6 Y

Siegel

1121

Vollständige Uebersicht

aller von dem Verfasser kultivirten und in verschiedenen Werken beschriebenen

Pflaumen

mit

ihren Charakteren.

Von

Dr. G. Liegel,

Apotheker zu Braunau am Inn, Besitzer der großen goldenen Civil-Ehren-Medaille mit Oehr und Band. Mitglied der k. k. ökonomischen Gesellschaft in Wien, des k. k. mährisch-schlesischen Obst-, Wein- und Gartenbau-Vereins in Mähren zu Brünn, des k. k. pomologischen Vereins in Böhmen zu Prag, der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Oesterreich ob der Enns und dem Herzogthume Salzburg, der k. bayer. allgemeinen praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf. Korrespondirendes Mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern zu München, der k. k. und ständischen Ackerbau-Gesellschaft in Kärnthen zu Klagenfurt, der k. k. Ackerbau-Gesellschaft in Steyermark zu Grätz, der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien, der k. ungarischen, ökonomischen Gesellschaft in Pesth, der herzogl. sächsischen, pomologischen Gesellschaft in Altenburg, der k. bayer. botanischen Gesellschaft in Regensburg, des Vereins zur Förderung des Gartenbaues in den k. preußischen Staaten zu Berlin, des herzogl. Gartenbau-Vereins in Thüringen zu Gotha, der k. böhmischen Gartenbau-Gesellschaft in Prag, des k. bayer. ökonomischen Vereines in München, des k. belgischen Vereins für Pomologie in Brüssel, der k. schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau. Ehrenmitglied des Vereins zur Förderung des Gartenbaues im Herzogthume Braunschweig, des Vereins für Pomologie und Gartenbau zu Meiningen, des Vereins für Gartenbau und Feldwirthschaft in Koburg, der Flora-Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden, der k. bayerischen praktischen Feld- und Gartenbau-Gesellschaft der bayerischen Pfalz zu Neustadt an der Haardt, des Vereins für Landwirthschaft und Gartenbau des Kantons Zürich.

Regensburg.

Druck und Verlag von Georg Joseph Manz.

1861.

280

BIBLIOTECA REGIA MONACENSIS

Seinen hochgeschätzten, pomologischen

Freunden und Pflaumen-Liebhabern

widmet

mit innigster Verehrung und Hochachtung

dieses Heft der Pflaumen

der Verfasser.

Vorrede.

Die Beschreibungen meiner angepflanzten und kritisch untersuchten Pflaumen erschienen in einem sehr langen Zeitraume in verschiedenen Werken: Im Frauendorfer Obstfreund, in den vereinigten Frauendorfer Blättern, in meiner systematischen Anleitung zur Kenntniß der Pflaumen II. Heft, in meiner Beschreibung neuer Obstsorten I. und III. Heft, in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau von J. G. Oberdick und Eduard Luckas.

Um nun diese zerstreut liegenden Beschreibungen in ein Ganzes zu bringen, entwarf ich diese vollständige Uebersicht aller von mir beschriebenen Pflaumen. Es sind darin die Hauptmerkmale der Frucht aufgezeichnet mit einer Citation der Beschreibung, in welchem Werke sie niedergelegt ist. Es ist ihr ein vollständiges Register beigegeben, um eine schnelle Uebersicht zu haben, welche Früchte beschrieben sind.

Der Verfasser hat aus allen Ländern seine Pflaumen gesammelt, hat sie sämmtlich großgezogen, den Baum und

die erhaltene Frucht untersucht, geprüft und kritisch beschrieben. Mehr als fünfzig Früchte, von meist ausgezeichneter Qualität hat derselbe aus dem Steine selbst gezogen, und berühmten Pomologen und Pflaumenliebhabern gewidmet.

Durch meine Pflaumenpflanzungen wurden viele sehr edle Früchte verbreitet, die mir durch die Länge der Zeit viele Bekannte und Freunde zuführten, denen ich nun für ihre Liebe und für ihr Zutrauen herzlich danke.

Man hat erst kurze Zeit eigentlich den hohen Werth der Pflaumen kennen gelernt, es gibt davon nun recht viele, eifrige Verehrer. Eine zuckersüße, vom Safte überfließende, vom Steine gut lösliche, aromatische Pflaume ist eine herrliche, kostbare Frucht, die nicht nur allein dem Steinobste, sondern auch überhaupt allem Obste den Rang streitig macht. Der große französische Obstkenner Quintinye,*) spricht sich offen aus, daß die Perdrigons-, die Katharinen- und Aprikosenpflaumen die besten Früchte der Welt seien. Unter allen Obstgattungen haben die Pflaumen den meisten Zuckerstoff und ein eigenthümliches Aroma von einem edlen und hohen Geschmacke; sie ersetzen in ungünstigen Jahren, da sie sehr tragbar sind, Pfirsiche und Aprikosen, theilweise selbst Aepfel und Birnen, und haben den Vorzug, daß sie vom Ende Juli bis Ende Oktober ihre Früchte ununterbrochen vom besten Wohlgeschmacke liefern. Getrocknet geben sie köstliche Gerichte.

Bei einer vollkommenen Pflaume fordert man:

---

*) Instruction pour les Jardins frutiers et potagers etc. Par. M. de la Quintinye. Paris 1690 p. 191.

1. Daß sie vor oder nach der Reifzeit der gemeinen Zwetsche zeitige.

2. Daß sie fest am Baume hänge, und nicht leicht abfalle.

3. Daß sie im Regen gar nicht, oder doch nicht leicht aufspringe.

4. Daß sie ein etwas festes, härtliches Fleisch habe.

5. Daß sie sich vom Steine löse.

6. Daß sie süß und edel aromatisch sei.

7. Daß sie vom Saft überfließe. —

8. Große Früchte zieht man den kleinen vor.

9. Frühpflaumen haben den Vorzug vor späteren.

10. Spätpflaumen sind wieder vorzüglich, sobald die gemeine Zwetsche vorüber ist.

In Deutschland verlieren alle Pflaumen von ihrem Werthe, sobald die gemeine Zwetsche am Markte erscheint; erst nach ihrer Reifzeit erhalten die Spätpflaumen wieder ihren hohen Werth.

Nebstdem, daß die Pflaumen durch die Prünellen und die gedörrten Zwetschen, sowie durch den Slibowitzer einen ausgebreiteten Handelsartikel geben, so enthält unter allem Obste die gemeine Zwetsche auf die Gesundheit des Menschen die meiste Wirkung.

Ich glaube nun meine Pflaumenarbeiten so ziemlich abgeschlossen zu haben; was ich künftig von den Früchten der vorräthigen noch ungeprüften Pflaumenstämme beschreiben werde, wird in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau erscheinen.

Ich mache hiemit bekannt, daß ich meine Obstbaumpflanzung durch Kauf meinem Gärtner, Herrn Au-

gustin Keindl, der mir länger als dreißig Jahre fleißig und getreu, sowie in Allem verläßlich beigestanden ist, übergeben habe. Diese wird durch meine Mitwirkung und Uebersicht in dem nämlichen Zustande erhalten, ergänzt, richtig gepflegt und davon die neuen Sorten auf ihre Aechtheit und Anwendbarkeit auf das hiesige Klima geprüft, wie es früher in meinen Anlagen zu geschehen pflegte. Zuschriften können unter meiner oder des Herrn Keindl's Firma gemacht werden.

Braunau am Inn im November 1860.

Dr. G. Liegel,
Apotheker.

Inhalt.

Seite

Vorrede VII

Die Pflaume.

I. Klasse.

Die Zwetsche.

I. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 1
II. „ mit rothen Früchten 6
III. „ mit gelben Früchten 13
IV. „ mit grünen Früchten 17
V. „ mit bunten Früchten 18

II. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 19
II. „ mit rothen Früchten 25
III. „ mit gelben Früchten 25
IV. „ mit grünen Früchten 27
V. „ mit bunten Früchten 29

II. Klasse.

Die Damaszene.

I. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 31
II. „ mit rothen Früchten 33
III. „ mit gelben Früchten 38
IV. „ mit grünen Früchten 44
V. „ mit bunten Früchten 47

Inhalt.

II. Ordnung.

		Seite
I.	Unterordnung mit blauen Früchten	48
II.	„ mit rothen Früchten	53
III.	„ mit gelben Früchten	59
IV.	„ mit grünen Früchten	62

Notizen.

Besondere Eigenschaften einiger Pflaumen	64
Ueber den Werth einer Pflaumensteinsammlung	67
Pflaumen, die gegenwärtig angepflanzt sind	69
Register	73

Vollständige Uebersicht

der

Pflaumen.

Kunstausdrücke.

Mittelgroß ist bei den Zwetschen, die gemeine Zwetsche, bei den Damaszenen, die große grüne Renklode, im Verhältniß zu diesen Früchten steht klein, sehr klein, groß, sehr groß. Der Stiel ist kurz, wenn er nicht 6 Linien mißt, derselbe ist sehr lang, wenn er 12 Linien und darüber mißt, was zwischen diesen liegt, ist lang, mittellang. Unten ist der Stiel, Oben ist der Kopf, der Nabel, der Stempelpunkt. Plattgedrückt ist die Frucht, wenn sie am Kopfe und Stiele gedrückt ist, so, daß die Breite und Dicke die Höhe übertrifft, gedrückt oder zusammengedrückt ist sie, wenn die beiden Backen, der Rücken oder der Bauch flach gedrückt sind. Ueber den Rücken läuft die Naht, gegenüber liegt der Bauch, die Backen bilden die beiden Seiten, den Durchmesser der Backen nennt man die Dicke der Frucht, das Ausmaaß vom Rücken zum Bauch die Breite, vom Stiel zum Kopfe die Höhe. Afterkanten des Steines nennt man die Erhabenheiten, welche über die Mitte der Backen von unten nach oben laufen.

Abkürzungen.

I. II. III. R.	heißt	I. II. III. Rang.
Obstb. Fr.	„	Frauendorfer Obstbaumfreund.
L. II. H. S.	„	Liegel's systematische Anleitung zur Kenntniß der Pflaume II. Heft.
Fr. Bl.	„	Vereinigte Frauendorfer Blätter.
B. n. Obstf.	„	Beschreibung neuer Obstsorten I. III. Heft.
Monatschr.	„	Pomologische Monatschrift.

Die Pflaume. Prunus.

I. Klasse.

Die Zwetsche. Prunus domestica.

Mit länglich-eiförmigen Früchten.

Mit einzelnen und gepaarten Blüthenstielen, stark gedrückten, oben und unten mehr und weniger spitz verlängertem Steine.

Die Höhe muß in die Augen fallen und gegen die Dicke und Breite wenigstens mehr als eine Linie messen. Bei sehr kleinen Früchten entscheidet das Augenmaß und die Form des Steines.

I. Ordnung.

Die wahre Zwetsche.

Prunus domestica vera.

Mit kahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils etwas wilder Vegetation des Baumes, mit Dornen in der Jugend, mit zähem, sehr hartem Holze und härtlichem, süßem, etwas weinsäuerlichem Fleische der Frucht.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

93. Nickitaer blaue Frühzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Gus Erik.

Klein, etwas eiförmig, nach unten etwas dicker. Rücken erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, zart, saftig, süß, ohne Parfüm, Stiel lang, fast kahl, Stein unablöslich, verschoben, oval, oben

spitziger, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strotzend tragbar, frühe, kleine Blüthe. Aus Nickita in der Krim. L. II. H. S. 2.

162. Echte Haferpflaume. ½ Aug. III. Rang.

Klein, oval, schwarzblau, Fleisch grünlich-gelb, fest, süßlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, oben scharf spitzig. Baum groß, treibt gerne Ausläufer, die Steine keimen gerne. Eine Krieche. L. II. H. S. 4.

100. Wahre Frühzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, etwas verschoben oval, unten etwas kleiner, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, dunkelblau, Fleisch gelb, härtlich, erhaben, zuckersüß, Stiel mittellang, fast kahl, Stein ablöslich, oben und unten fast gleichspitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, empfindlich für Kälte, mäßig tragbar, sehr späte Blüthe, Aeste in sehr spitzigen Winkeln. Vortreffliche Frucht. L. II. H. S. 6.

261. Wangenheim's Pflaume. ⅓ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, nach unten etwas verjüngt, dunkel-violett, Stiel mittellang, fast kahl, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftreich, süßerhaben, Stein löslich, einseitig oval, Rücken mehr erhoben, Breite mehr nach unten. Baum groß, tragbar. Aehnlich in Allem der wahren Frühzwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 101.

240. Alibuchari. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, dunkelviolett, oval, oben spitzig, Stil fast kahl, Fleisch gelblich-grün, härtlich, saftig, süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, verschoben, lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum kräftig. Aus Persien. Fr. Bl. J. 1844. S. 101.

213 ½ Donauer's Zwetsche. I. Rang.

Ist ebenfalls eine sehr edle, gemeine Frühzwetsche, häufiger Vermehrung werth. B. n. Obstf. Heft I. S. 14.

238. Große blaue Nickitaer Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, schwarzblau, kurz, eiförmig-oval, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftig, sehr edel

süß erhaben, Stein unablöslich, einseitig oval, oben und unten spitz. Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 7.

344. Buhl Eltershofen. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, Fleisch weißgelb, süßerhaben, edel, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, einseitig oval, afterkantig. Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 11.

129. Liegel's Frühzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr edle, gemeine Zwetsche. B. n. Obstf. I. H. S. 11.

150. Herrenhäuser Eierpflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, langoval, Fleisch dunkelblau, gut ablöslich, zuckersüß, erhaben aromatisch. Baum tragbar. Monatsch. 1858. S. 281.

2. Violette Dattelzwetsche. Liegel. 1/5 Sept. II. Rang.

Prunus austriaca.

Groß, länglich verschoben, umgekehrt eiförmig, nach unten eine lange, stumpfe Spitze, Rücken stark erhoben, dunkelviolett, Fleisch etwas grünlich-gelb, härtlich, gröblich, angenehm süß-weinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten lang vorgeschoben, stumpfspitzig, Breite etwas mehr nach oben. Baum groß mit Dornen, nicht empfindlich, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 10.

160. Dörrell's neue große Zwetsche. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, Rücken nur etwas mehr erhoben, Breite stark nach unten, dunkelviolett, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, saftig, angenehm süß, bisweilen fein säuerlich, Stiel ziemlich lang, kahl, Stein unablöslich, einseitig eiförmig, oben scharf-, unten stumpfspitzig, Breite nach unten. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. 12.

94. Cooper's große, rothe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang.

Groß, oval, dunkelviolett, gezuckert, sehr edel. Stein ablöslich, klein. Monatschr. 1856. S. 409.

155. August-Zwetsche. M. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig, schwarzblau, Fleisch weißgelb,

angenehm süß. Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 9.

104. Italienische Zwetsche. ½ Sept. 1. Rang.

Groß, oft sehr groß, unregelmäßig umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpfspitzig, Breite in der Mitte, Rücken nur etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, saftig, erhaben süß-weinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, oben kurz spitzig, unten etwas verlängert stumpfspitzig, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig tragbar. Blätter charakteristisch stark hängend, sehr schmal, lang, etwas steifhaarig. L. II. H. S. 14. Eine ausgezeichnete Frucht.

207. Große blaue Zwetsche von der Worms. ½ Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, ungestaltet umgekehrt eiförmig, unten abgestutzt, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 17.

97. Nickitaer Spätzwetsche. ½ Sept. II. Rang.

Gus al Erik.

Fast mittelgroß, dunkelviolett, umgekehrt-eiförmig, auch oval, um die Mitte fast rund, Stiel mittellang, behaart, Fleisch härtlich, weißgelb, saftig, recht angenehm süß, Stein ablöslich, klein, oval. Baum nicht groß, tragbar. Blüthen klein. Fr. Bl. J. 1844. S. 126.

116. Große englische Zwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, unten spitzig, Breite etwas nach oben, Rücken und Bauch ziemlich gleich erhoben, schwarzblau, Fleisch etwas grünlich-gelb, härtlich, sehr erhaben süß, Stiel lang, kahl, Stein ablöslich, oben abgerundet etwas spitz, unten vorgeschoben stumpfspitz, Breite etwas nach oben. Baum groß, mäßig tragbar, kenntlich durch langspitzige Blätter. Vortrefflich. L. II. H. S. 16.

270. Große Frühzwetsche. M. Sept. I. Rang.

Groß, oft sehr groß, dunkelblau, oval, oben und unten stumpfspitz, flach, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, weinsäuerlich, Stiel behaart, dünn, lang, einseitig, lanzettförmig, oben und unten scharf spitz, Baum kräftig, gesund, trägt selten strotzend. B. n. Obstf. III. H. S. 1.

383. Die Glocke. M. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, schwarzblau, Stiel unten sehr schön, regulär geformt, Zwetschen körnig, recht gut. B. n. Obstf. III. H. S. 2.

190. Neue Agener Pflaume. E. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, kurz oval, oben und unten ziemlich gerundet, Fleisch weißlich, saftig, etwas weich, süß, angenehm, kaum merklich säuerlich, Stiel dünn, kahl, lang, Stein unlöslich, oval, Baum sehr lebhaft, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 3.

171. Gemeine kleine Zwetsche. ½ Sept. III. Rang.

Prunus exigua Bechst.

Fast klein, oval, Rücken stark erhoben, dunkelblau, Fleisch gelb, weich, saftig, süß-weinig, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, oval, unten spitziger, Baum klein, treibt häufige Ausläufer, dauerhaft, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 19.

364. Ungarische Dattelzwetsche. ⅓ Sept. II. Rang.

Sehr groß, dunkelviolett, länglich umgekehrt eiförmig, nach unten verlängert, umgestaltet, Stiel lang, behaart, Fleisch grünlichgelb, gröblich, glänzend, härtlich, saftig, angenehm süß, Steine ablöslich, einseitig lanzettförmig, schwach afterkantig. Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 22.

71. Siebenbürger-Zwetsche. ½ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas kleiner, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, härtlich, angenehm süßweinsäuerlich, Stiel sehr lang, behaart, Stein unablöslich, oben spitzig, unten verlängert stumpf, Breite in der Mitte. Baum groß, tragbar, große, späte Blüthen. L. II. H. S. 21.

399. Rossy's frühe Hauszwetsche. I. Rang.

Eine etwas frühere gemeine Hauszwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 140.

11. Hauszwetsche, gemeine Zwetsche. I. Rang. L.

Prunus domestica.

Ueberall bekannt. Eine Art. L. II. H. S. 24.

309. Dollaner-Zwetsche. I. Rang.

Eine etwas größere, gemeine Zwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 140.

334. Wisinger'sche Zwetsche. E. Sept. I. Rang.

Gemeine Zwetsche, groß, gut. B. n. Obstf. S. 13, I. H.

96. Englische Zwetsche. Sept. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, kurz-oval, dunkelviolett, Fleisch goldgelb, härtlich, nicht zu saftig, erhaben zuckersüß, Stiel sehr lang, kahl, Stein ablöslich, oval, oben stumpf-, unten scharfspitzig, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 28.

369. Balaszky's Spätzwetsche. ½ Okt. I. Rang.

Neu, mittelgroß, umgekehrt eiförmig, dunkelblau, sehr edel aromatisch. B. n. Obstf. III. H. S. 3.

60. Unvergleichliche. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, verschoben oval, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, dunkelviolett, Fleisch goldartig-gelb, härtlich, saftig, köstlich erhaben süß, Stiel lang, fast kahl, Stein unablöslich, einseitig oval, oben abgerundet kurzspitzig, unten stumpfspitzig, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. 31.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

288. Rother Spilling. ⅓ Aug. II. Rang.

Klein, oval, nach unten etwas verjüngt, rothblau, Stiel fast kahl, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, süß mit etwas Aroma, Stein ablöslich, einseitig ausgebogen, oval, oben und unten spitz,

Rücken mehr erhoben, etwas afterkantig. Baum klein, kleine Zweige, kleine Blätter, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 21.

227. Rothe, süße Königspflaume. M. Aug. I. Rang.

Groß, umgekehrt-eiförmig, oben flach abgerundet, unten stumpfspitz, hellroth, dunkle Flecke, viele gelbe Punkte, Fleisch weißgelb, glänzend, fasserig, saftig, weich, süß, aromatisch, Stiel lang, dünne, rostig, behaart, Stein ablöslich, oval, oben kurz feinspitz, unten vorgeschoben, stumpfspitz, afterkantig, Backen narbig, Baum mäßig groß, sehr tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 31.

357. Liegel's Zwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, kurz eiförmig, Stiel kurz, kahl, Fleisch um die Haut und den Stein etwas röthlich, sonst gelblich, brüchig, weich, saftreich, ungemein süß erhaben, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 23.

98. Nickitaer Dattelzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Bardak Erik.

Ziemlich groß, lang umgekehrt eiförmig, schwach rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch gelb, härtlich, angenehm süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, lang umgekehrt eiförmig. Baum stark, mäßig tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 22.

298. Purpurzwetsche. 2/3 Aug. II. Rang.

Groß, fast kreiselförmig, oben schief, platt gedrückt, purpurroth, viele goldfarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht allzu saftig, süß aromatisch, Stiel kurz, kahl, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 4.

25. Spitzzwetsche. E. Aug. II. Rang.

Groß, eiförmig, langspitzig, Breite stark nach unten, blaulichroth, Fleisch gelb, fest, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm weinsäuerlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, lanzettförmig, oben zugespitzt, unten stumpfspitzig, Breite stark nach unten, Baum mittelgroß, mäßig tragbar. L. II. H. S. 33.

8. Rothe Kaiserpflaume. E. Aug. II. Rang.

Sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, Breite in der Mitte, Rücken und Bauch nicht bedeutend verschieden, rothblau, Fleisch weißlich-gelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, erhaben süß, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, länglich, oben stumpf-, unten langspitzig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. 35.

75. Nolten's ungarische Pflaume. Anf. Sept. I. Rang.

Frucht groß, rothblau, lang-oval, mit blaßgelben Punkten und rostigen Flecken, Stiel behaart, mittellang, dick, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß-aromatisch, Stein ablöslich, länglich, Baum stark, mäßig tragbar. Monatschr. 1861.

Zweige von Herrn Oberdieck, Superintendenten zu Jeinsen bei Hannover.

73. Dörrels neue Purpurzwetsche. Anf. Sept. II. Rang.

Groß, lebhaft roth, umgekehrt eiförmig, dunkle Flecken, viele graue Punkte, Stiel über zwölf Linien lang, rothfärbig, behaart, Fleisch weißgelb, saftig, faserig, weich, angenehm, weinsäuerlich-süß, Stein gut ablöslich, oval, Baum groß, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 32.

367. Porsch's rothe Zwetsche. M. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, regulär, braunroth, Fleisch zart, saftig, zuckersüß, angenehm, Stiel dünn, behaart, Stein unlöslich, einseitig eiförmig, oben scharfspitz, unten stumpf, Baum stark, strotzend, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 25.

313. Schamal's Frühzwetsche. Ende Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, roth, Fleisch gelb, sehr saftig, zuckersüß-aromatisch, unablöslich. Monatschr. 1858. S. 281.

123. Rothes Zeiberl. E. Aug. II. Rang.

Klein, regulär-oval, dunkelroth, Fleisch weißgelb, weich, zart, saftig, angenehm, säuerlich-süß, Stiel lang, fast kahl, Stein ziemlich ablöslich, oval, oben spitzig, unten etwas vorgeschoben stumpf spitzig. Baum klein, strotzend in Klumpen tragbar. L. II. H. S. 38.

136. Wahre Hahnenhode. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, eiförmig, rothbraun, Stiel behaart, sehr lang, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, angenehm fein weinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig. Baum groß, frühe, kleine Blüthen. B. n. Obstf. III. S. 27.

32. Rothe Eierpflaume. E. Aug. II. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, oben stark gerundet, unten spitzig, Rücken höher, Breite ziemlich in der Mitte, geflammt dunkelroth. Fleisch hellgelb, faserig, etwas härtlich, schmelzend, sehr angenehm erhaben, weinsäuerlich-süß, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben kurz scharfspitzig, unten verlängert, stumpfspitzig, Rücken stark erhoben, Breite etwas mehr oben. Baum groß, fast jährlich strotzend tragbar. L. II. H. S. 40.

73. Dörrell's neue Purpurzwetsche. E. Aug. II. Rang.

Eine schöne, große Varietät der rothen Eierpflaume, ihr sehr ähnlich. L. II. H. S. 42.

290. Pflaume von Mimms. E. Aug. II. Rang.

Ebenfalls eine Varietät der rothen Eierpflaume. Fr. Bl. J. 1844. S. 346.

226½ La prune maraichère. Gartenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, eiförmig, Stiel mittellang, feinbehaart, Fleisch hellgelb, glänzend, sehr saftig, etwas härtlich, schmelzend, delikat, süß erhaben, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum klein, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. J. 1847.

147. Agener Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig, umgekehrt eiförmig, oben platt abgerundet, unten stark abnehmend, stumpfspitz, bläulich roth, häufige, goldfarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht saftig, zuckersüß, erhaben, Stiel lang, kahl, dünne, Stein unlöslich, oval, Rücken erhoben, Baum mäßig groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 28.

133. Rothe prachtvolle Huling. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, unten ſtumpfſpitzig, oben flach abgerundet, Rücken etwas mehr erhoben, Breite nach oben, dunkelroth, Fleiſch gelb, härtlich, ſchmelzend, überaus angenehm, eigenthümlich muskatellerartig ſüß, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, einſeitig oval, oben zugeſpitzt, unten zuſammengedrückt, vorgeſchoben, ſtumpfſpitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte. Baum groß, Blüthen ſtrotzend, klein. Die Frucht zerſpringt im Regen gerne. Köſtlich. L. II. H. S. 43.

121. Geiſepflaume. E. Aug. II. Rang.

Faſt mittelgroß, eiförmig, ſpitzig, roth, ſchöne Frucht mit weißgelbem Fleiſch, ſüß, kaum merklich ſäuerlich, Stein einſeitig eiförmig, langſpitzig, unablöslich, Baum zart, klein. B. u. Obſtſ. I. H. S. 26.

350. Schmidt's rothe Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, braunroth, Fleiſch gelb, etwas härtlich, glänzend, ſaftig, ſüß, erhaben aromatiſch, Stiel dünn, lang, kahl, Stein ablöslich, oval, Baum ſtark, fruchtbar. B. u. Obſtſ. I. H. S. 29.

277. Berlepſch's violette Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ſehr ſchön regulär geformt, oval, nach unten und oben ziemlich gleich abgerundet, violettblau, Fleiſch weißgelb, härtlich, ſehr ſaftig, ſüß, fein, ſehr gut. Stiel lang, dünn, behaart, Stein ablöslich, Baum kräftig, tragbar. B. u. Obſtſ. III. H. S. 5.

255. Rubens' Burgunder Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Groß, oval, oben platt gedrückt, unten verjüngt, ſtumpfſpitz, rothbraun, öfters große, faſt ſchwarze Flecken, goldfarbene Punkte, Fleiſch weißlich, härtlich, aber zerfließend, ſtrahlich, ſüß, edel, erhaben aromatiſch, Stiel dünn, ſehr lang, behaart, Stein ablöslich, zehn Linien lang, oben ſpitz, unten ſtumpfſpitz, Baum kräftig und tragbar. B. u. Obſtſ. III. H. S. 6.

166. Nickitaer Hahnenhode. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast groß, oval, oben zizzenförmig spitzig, unten verlängert spitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte, rothbraun, Fleisch pomeranzengelb, weich saftig, recht angenehm süß, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben lang scharfspitzig, unten vorgeschoben spitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe kleine Blüthen. L. II. H. S. 46.

137. Violette Kaiserpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, oval, oben abgerundet, unten verjüngt, Rücken und Bauch fast gleich, Breite in der Mitte, dunkel-violett, Fleisch weißgelb, fest, nicht zu saftig, sehr erhaben süß, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, oval, oben stumpfspitzig, unten vorgeschoben abgestutzt spitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Die Frucht zerspringt im Regen gerne. Vortrefflich. L. II. H. S. 47.

13. Rothe Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, fast oval, unten mehr abgerundet, Breite nur etwas unter der Mitte, Rücken und Bauch ziemlich gleich, rothblau, Fleisch weißgelblich, fest, sehr fein, saftig, überaus süß, köstlich, erhaben, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, oval, oben und unten abgerundet, Rücken wenig erhoben, Breite in der Mitte, auch etwas nach unten, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar, späte kleine Blüthe. Die Frucht zerspringt im Regen sehr gerne. L. II. H. S. 50.

119. Mailändische Kaiserpflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in der Mitte, dunkel-violett, Fleisch gelb, fest, zart, saftig, zuckersüß, äußerst müskirt-aromatisch, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten vorgeschoben, Rücken stark erhoben. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. 50.

57. Violette Jerusalems-Pflaume. ½ Sept. I. Rang.

Sehr groß, rothbraun, eiförmig, oben spitz, unten kurz vorgeschoben spitz, Breite stark nach unten, Rücken höher, Fleisch gelb, gröblich, fest, saftig, angenehm süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, oben langspitz, unten stumpfspitz, Rücken höher, Breite stark unten, Stiel lang, behaart. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. 54.

206. Hackel's große Zwetsche. M. Sept. II. Rang.

Groß, oval, dunkelroth, graue Punkte zahlreich, Fleisch weißgelb, härtlich, etwas zähe, saftig, süß, angenehm aromatisch, Stiel mitteldick, lang, fast kahl, Stein unlöslich, einseitig oval, oben und unten vorgeschoben, stumpfspitz, stark rauh, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 34.

293. Plattrunde Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Fast groß, oval, auf beiden Seiten etwas gedrückt, rothbraun, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlich-gelb, fein, saftig, angenehm süß weinsäuerlich, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum stark, tragbar. Dittrich, Handb. II. Thl. S. 238.

164. Nienburger Eierpflaume. M. Sept. II. Rang.

Groß, kurz umgekehrt eiförmig, violettblau, oben flach abgerundet, unten stumpfspitz, violettblau, auch rothbraun, röthlich graue Punkte, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, zuckersüß aromatisch, Stiel sehr lang, kahl, Stein ablöslich, einseitig oval, oben kurz fein-, unten stumpfspitz, Baum groß, strotzend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 35.

33. Blaue Eierpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, rothblau, umgekehrt eiförmig, oben gerundet, unten verjüngt stumpfspitz, Breite nach oben, Bauch etwas mehr erhoben, Fleisch goldgelb, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm, süß, fein weinsäuerlich, zwetschenartig, Stein ziemlich ablöslich, oben abgerundet, kurz scharfspitz, unten zusammengedrückt, etwas vorgeschoben stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite nach unten, stark afterkantig, Stiel lang, behaart. Baum groß, fast jährlich tragbar, aber selten reichlich. L. II. H. S. 57.

403. Abruzzen-Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Groß, lang, auf beiden Enden spitz, roth, süßsäuerlich, unablöslich. Monatschr. S. 411. 1856.

267. Röthlich-braune Zwetsche. 1/2 Sept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, rothbraun fast schwarz, Punkte unansehnlich, Stiel neun Linien lang, kahl, dick, Fleisch gelb, härtlich, saftig, süß, gut, etwas matt, Stein ablöslich, verschoben oval, oben abgerundet, etwas spitz, unten stumpfspitzig, afterkantig, Baum stark, fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 36.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

88. Scanarda. 1/3 Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, länglich umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch wachsgelb, sehr fest, saftig, lieblich zuckersüß, Stein unablöslich, lanzett-umgekehrt eiförmig. Baum groß, sehr tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 157.

45. Gelbe Frühzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Fast groß, etwas orleangelb, stark verschoben oval, oben schief abgerundet, unten etwas mehr stumpf, Rücken erhoben, Breite meistens in der Mitte, Fleisch gelb, weich, sehr saftig, etwas matt süß, Stein ziemlich ablöslich, oval, oben etwas spitz, unten meistens abgestutzt, Rücken höher, Breite in der Mitte, Stiel lang, behaart. Baum mittelgroß, äußerst fruchtbar. L. II. H. S. 50.

79. Kleine gelbe Eierpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, oben platt, unten stumpfspitz. Stiel kurz haarig, Farbe gelb, an der Sonne roth angelaufen, Fleisch gelb, härtlich, aromatisch süß, Stein nicht ganz löslich, oval. Baum groß, fruchtbar. B. n. Obstf. S. 7.

310. Frost's gelbe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang.

Frost Gage.

Frucht sehr groß, umgekehrt eiförmig, gelb, an der Sonne röthlich angelaufen, stark roth punktirt, Stiel kahl, lang, dick,

Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, süß aromatisch, Stein groß, umgekehrt eiförmig, afterkantig, unablöslich, Baum kräftig, fruchtbar. Frost Gage ist eine lieblich gestaltete, sehr schöne, recht gute, dabei sehr große Frucht. Monatschr. 1861.

Zweige erhalten von Herrn Major Buhl Eltershofen in Eltershofen. J. C. Frost ist ein berühmter Baumzüchtler in Pensylvanien in Nordamerika.

21. Gelbe Eierpflaume. Liegel. 1/3 Sept. II. Rang.

Prunns grandissima.

Sehr groß, etwas röthlich-gelb, oval, unten etwas dünner, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch weißgelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, oben spitz, unten vorgeschoben stumpfspitz. Baum groß, recht fruchtbar. Eine Art. L. II. S. 62.

117. Dörrell's neue weiße Diaprée. 2/5 Aug. I. Rang.

Fast klein, gelb, oval, oben mehr abgerundet, Rücken und Bauch fast gleich, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, härtlich, sehr saftig, sehr fein erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, oben spitz, unten stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 66.

114. Wahre weiße Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast klein, gelb, oval, nach unten etwas verjüngt, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, glänzend, saftig, schmelzend, etwas härtlich, vom feinsten, äußerst süßen, aromatisch erhabenen Geschmack, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig. Baum kräftig, mäßig tragbar, kleine späte Blüthe. Sehr gut. B. u. Obstf. III. H. S. 41.

130. Hartwiß's gelbe Zwetsche. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, wachsgelb, einseitig eiförmig, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch strahlig, weißlich-gelb, härtlich, saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, lanzettförmig. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1846. S. 212.

66. Gelbe Marunke. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, Stiel mittellang, kahl, Farbe wachsgelb, Fleisch weißgelb, saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, lanzettförmig, Baum tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 39.

27. Gelbe Jerusalemspflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Sehr groß, wachsgelb, kurz oval, oben flach abgerundet, unten vorgeschoben, spitzig, Breite meistens etwas nach oben, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, saftig, gröblich, sehr süß und angenehm, Stein ablöslich, oben stark gerundet, unten vorgeschoben abgestutzt spitz, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum groß, selten volltragend. Blüthen groß. L. II. H. S. 64.

349. Jahn's gelbe Jerusalemspflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Groß, kurz oval, wachsgelb, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch hellgelb, sehr saftig, etwas härtlich, süß-erhaben-aromatisch, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitzig, etwas afterkantig. Baum groß, mäßig tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 189.

373. Rudolfs-Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Fast groß, umgekehrt eiförmig, wachsgelb, weißliche Punkte, selten Röthe, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, glänzendstrahlig, härtlich, saftig, zuckersüß, etwas aromatisch, Stein nicht ganz ablöslich, lang, umgekehrt eiförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, afterkantig, Baum groß, mittelmäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 40.

177. Gelbe Prünelle. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, gelb, süß, gewürzt, hart ablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. 8.

395. Topas. E. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, süßsauer, Stein nicht gut löslich. Monatschr. 1856. S. 411.

371. Waterloo-Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, auf beiden Seiten stark gedrückt, Stiel sehr lang, fast kahl, Farbe grünlich-gelb, roth punktirt-

gefleckt, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, sehr edel aromatisch, zuckersüß, Stein löslich, oval, Baum groß, fruchtbar. Monatschr. 1855. S. 281.

229. Pomeranzenzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, Stiel lang, kahl, Farbe goldgelb, roth marmorirt, sehr schön, Fleisch gelb, härtlich, saftig, sehr edel, süß, Stein löslich, oval, Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 9.

220. Coë's rothgefleckte Pflaume. E. Sept. I. Rang.

Coë's Golden Drop Plum.

Sehr groß, kurz umgekehrt, eiförmig, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch ziemlich gelb, zart, weich, etwas faserig, überfließend vom Saft, äußerst erhaben aromatisch, süß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, afterkantig. Baum stark, tragbar. Große frühe Blüthe. Gute Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. 46.

84. Phiolenartige gelbe Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, saftig, zart, erhaben-süß, Stein unablöslich lanzettförmig, unten langspitz, etwas afterkantig. Baum in allen Theilen klein, mäßig tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 190.

59. Große gelbe Dattelzwetsche. Okt. III. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, oben schief abgerundet, unten verjüngt stumpfspitz, Rücken und Bauch nicht stark verschieden erhoben, Breite nach oben, wachsgelb, Stiel sehr lang, fast kahl, Fleisch gelb, härtlich, saftig, vollkommen süß, aber matt, Stein unablöslich, oben stumpfspitz, unten verlängert zackig spitzig, Breite nach oben, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe, große Blüthe. L. II. H. S. 68.

355. Gelbe Spätzwetsche. Sept. Okt. I. Rang.

Eiförmig, spitzig, mittelgroß, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, lieblich aromatisch zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 49.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

307. Heupflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Bitschen Erik.

Mittelgroß, oval, Stiel sehr lang, behaart, Farbe gelbgrün, Fleisch grünlich-gelb, weich, sehr saftig, angenehm süß-weinsäuerlich, Stein löslich, eiförmig-spitz, Baum mittelgroß, sehr tragbar. Zerspringt im Regen nicht. B. n. Obstf. I. H. S. 73.

289. Buel's Lieblingszwetsche. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, röthlich angelaufen, grün, zerspringt im Regen gerne. Stiel zehn Linien lang, kahl, etwas eingesenkt, Fleisch grünlich gelb, saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten lang, scharfspitz, Baum häufiger Vermehrung nicht werth. B. n. Obstf. III. H. S. 10.

202. Große grüne Weinpflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, gelblich-grün, walzenförmig-oval, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, zart, überfließend vom Saft, sehr angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, unten vorgeschoben stumpfspitz, oben abgerundet feinspitzig, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, stark afterkantig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. 71.

80. Grüne Inselpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Fast mittelgroß, gelblich-grün, etwas birnförmig, unten spitzig, oben stumpf, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in der Mitte, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelbgrün, fein, saftig, schmelzend, erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, unten etwas mehr als oben spitzig, Rücken stark gewölbt, Breite in der Mitte. Baum groß, nicht tragbar. L. II. H. S. 73.

3. Italienische grüne Zwetsche. 1/3 Sept. II. Rang.

Groß, gelbgrün, walzenförmig oval, Stiel lang, behaart,

Fleisch gelblich-grün, etwas fest, sehr zart, saftig, erhaben fein, fast übermäßig zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben und unten fast gleich spitz, Rücken mehr erhoben, Breite in der Mitte, Baum groß, dauerhaft, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 75.

200. Holländische Zwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, grün, Stiel mittellang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, saftreich, äußerst zuckersüß, Stein unablöslich, lanzettförmig, Baum mittelgroß, selten volltragend. Fr. Bl. J. 1844. S. 204.

156. Kleine grüne Zwetsche. ⅓ Sept. III. Rang.

Sehr klein, regulär oval, gelblich-grün, Stiel lang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, zart, saftig, angenehm süß-säuerlich, Stein fast ablöslich, oben und unten spitzig, Rücken höher, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig fruchtbar. L. II. H. S. 77.

200. Holländische Zwetsche. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grün, zwetschenförmig, Stiel mittellang, behaart, Fleisch unlöslich, grünlich, mattsüß, Stein oval, Baum unfruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 75.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

302. Oberdeck's gestreifte Eierpflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, gelb, roth angelaufen, umgekehrt eiförmig, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, sehr angenehm süß, Stein löslich, lanzettförmig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 50.

II. Ordnung.

Damaszenenartige Zwetsche.

Prunus damasceno-domestica.

Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

Mit größtentheils mehr zahmer, damaszenenartiger Vegetation des Baumes und zarterem, weicherem Fleische der Frucht.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

339. Sämling der Johannispflaume. I. Gen. III. Baum. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, dunkelviolett, Stiel lang, feinbehaart, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, süß-fein-weinsäuerlich erhaben, Stein ablöslich, eiförmig, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, äußerst tragbar. Die Frucht in Allem der gemeinen Zwetsche ähnlich. Fr. Bl. J. 1844. S. 197.

428. Firbas's frühe Schütterhaferin. 1/2 Aug. I. Rang.

Klein, schwarzblau, eiförmig, aromatisch-süß, Stein ablöslich, Baum mittelgroß, tragbar. P. Monatschr. 1858. S. 8.

257. Lucas's Frühzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, dunkelviolett, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, edelsüß. Stein löslich, oval, Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 1844. S. 197. P. Monatschr. 1855. S. 155.

320. Kleine blaue Frühzwetsche. 1/2 Aug. I. Rang.

Klein, oval, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, sehr edelsüß, Stein unlöslich, lanzettförmig, Baum kräftig, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 52.

274. Frühe englische Zwetsche. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, umgekehrt eiförmig, Stiel kurz, kahl, Fleisch gelblich, saftig, zuckersüß erhaben, Stein unlöslich, umgekehrt eiförmig, Baum tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 11.

337. Blaue Kaiserin. 1/2 Aug. II. Rang.

Groß, unregulär oval, schwarzblau, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, saftig, süßweinig, Stein unlöslich, oval, Baum kräftig. B. u. Obstf. III. H. S. 12.

407. Rodt's frühe große Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, dunkelroth, oval, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb,

saftig, erhaben süß, Stein löslich, lanzettförmig, Baum stark, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 14.

332. Bazalicza's große blaue Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, Stiele lang, behaart, Fleisch gelb, faserig, weich, zart, süß-feinweinsäuerlich, Stein unablöslich, lanzettförmig, afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar, Blüthen groß, frühe. Die Stielhöhle hat charakteristisch einen knorpelartigen Ring. B. u. Obstf. III. H. S. 53.

124. Violette Diaprée. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, Bauch mehr aufgeworfen, Breite stark nach unten, schwarz-blau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb-weiß, glänzend, härtlich, sehr lieblich, erhaben-süß, Stein ablöslich, eiförmig, unten stumpf-, oben scharfspitzig, Bauch erhoben, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strotzend tragbar. Vorzüglich. L. II. H. S. 79.

9. Große Zuckerzwetsche. Ungarische Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, schwarzblau, oval, auf beiden Seiten stark gedrückt, Rücken erhoben, Breite in der Mitte, auch etwas nach oben, Stiel ziemlich lang, kahl, Fleisch weiß-gelblich, etwas fest, glänzend, sehr saftig, ungemein erhaben süß, Stein ablöslich, verschoben lang-oval, oben spitzig, unten etwas abgestutzt, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in der Mitte. Baum groß, selten recht volltragend, Blüthe früh, Frucht ausgezeichnet. L. II. H. S. 81.

210. Eugen Fürst's Frühzwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, schwarzblau, röthliche Punkte, Stiel neun Linien lang, mäßig dick, kurz behaart, rothfarbig, Fleisch grünlich weiß, etwas härtlich, sehr saftig, äußerst süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, lanzettförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, Baum mittelgroß, äußerst tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 58.

228. Jesum Erik. Ende Aug. III. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, süß, gut, Fleisch ablöslich, Baum ohne Werth. B. u. Obstf. III. H. S. 13.

388. Donauer's frühe Pflaumenzwetsche. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, dunkelviolett, süß, zwetschenartig, gewürzt, Fleisch unablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. 13.

146. Pflaume ohne Stein. E. Aug. III. Rang.

Sehr klein, eiförmig, Rücken etwas höher, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich-grün, zähe, angenehm sauer, Mandel oft taub, ablöslich. Baum mittelgroß, mäßig fruchtbar, Blüthe spät und klein. L. II. H. S. 84.

118. Melnicker Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, gut eiförmig, unten stark stumpf, oben ziemlich spitzig, Rücken höher, Breite weit unten, Stiel ziemlich lang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, sehr süß und recht angenehm, Stein nicht gut löslich, verschoben oval, unten stumpf-, oben kurz-scharfspitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte, Dicke nach unten. Baum mittelgroß, fruchtbar. L. II. H. S. 86.

64. Kleine Zuckerzwetsche. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast klein, oval, unten etwas verjüngt, Breite in der Mitte, Rücken und Bauch fast gleich, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich, härtlich, erhaben süß-feinweinsäuerlich, Stein ablöslich, oben scharf-, unten stumpfspitzig, Rücken etwas höher, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 88.

67. Diamantpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, oval, Stiel mittellang, kahl, Fleisch gelb, weich, nicht zu saftig, süßweinartig, Stein unlöslich, oval, Baum kräftig, reichlich tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 57.

450. Riesenzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, oft sehr groß, oval, schwarzblau, Fleisch gelb, saftig, härtlich, süß aromatisch, Stein gut löslich, Baum sehr tragbar.

Die Frucht zerspringt im Regen niemals und hängt fest am Baum. P. Monatschr. 1858. S. 281.

402½ Rodt's blaue Zwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpfspitz, dunkelviolett, Punkte wenig bemerkbar, Stiel neun Linien lang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, erhabenaromatisch, Stein ablöslich, afterkantig, Baum kräftig, sehr tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 13.

326. Wildling von Shropshire. ⅓ Sept. II. Rang.

Groß, eiförmig, schwarzblau, Stiel mittellang, fast kahl, Fleisch gelblich-grün, fest, saftig, süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, lanzettförmig. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. B. u. Obstf. III. H. S. 50.

275. Bischofsmütze. ½ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, oval, Stiel mittellang, kurz behaart, Fleisch härtlich, grünlich-gelb, saftreich, erhaben zuckersüß, Stein einseitig oval, unablöslich. Baum groß, tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 59.

85. Ransleben's Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, verschoben oval, oben nur etwas dünner, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte, Stiel fast sehr lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, recht angenehm süßsäuerlich, Stein unablöslich, oval, oben und unten stumpfspitz, Baum groß, fruchtbar. L. II. H. S. 89.

111. Brünner Zwetsche. Sept. Okt. II. Rang.

Sehr klein, schwarzblau, eiförmig, fast oval, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, angenehm feinweinsäuerlich-süß, Stein nicht gut ablöslich, oval, unten stumpf-, oben kurzspitz, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum klein, tragbar, frühe, kleine Blüthen. L. II. H. S. 91.

51. Dunkelblaue Kaiserin. Okt. II. Rang.

Fast groß, schwarzblau, oval, unten etwas dünner, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel lang, behaart,

Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, süß, ohne besonderes Aroma, Stein unablöslich stark gedrückt, oben obgerundet, unten etwas verlängert stumpfspitz, Rücken und Bauch nicht bedeutend verschieden, Breite ziemlich in der Mitte, etwas afterkantig. Baum stark, tragbar. L. II. H. S. 93.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

370. Biondeck's rothe Frühzwetsche. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, hellroth, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr edel, Stein löslich, oval, afterkantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. S. 61.

323. Meierböck's rothe Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch goldgelb, sehr saftig, zuckersüß erhaben, Stein löslich, eiförmig, afterkantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 62.

35. Rothe Renklode. E. Aug. I. Rang.

Groß, lichtroth, oval, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelb, süß-erhaben, Stein fast löslich, oval, Baum stark, tragbar. B. n. Obstf. S. 134.

47. Rothe Zwetsche. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Prunus oxycarpa Bechst.

Mittelgroß, braunroth, umgekehrt eiförmig, unten ziemlich spitz, Breite etwas nach oben, Rücken und Bauch ziemlich gleich, Stiel ziemlich lang, behaart, Fleisch gelb, trocken, süß-säuerlich, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten zackig spitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum sehr groß, äußerst tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 96.

81. Burgunder-Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, röthlich-schwarz, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten spitz, Rücken und Bauch fast gleich hoch, die Breite

stark nach oben, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich, härtlich, saftig, recht angenehm zuckersüß, Stein nicht ganz löslich, einseitig lanzettförmig, oben kurz scharfspitzig, unten lang stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite nach oben. Baum groß, ziemlich tragbar, frühe große Blüthen. Aus Monza. L. II. H. S. 98.

294. Sharp's Emperor. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas verjüngt, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch goldgelb, saftig, schmelzend, sehr edel, zuckersüß erhaben, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, afterkantig. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. J. 1845. S. 269.

408. Rodt's frühe große Pflaumenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, auch sehr groß. Zwetschenförmig-oval, oben mehr spitz, dunkelroth, kleine gelbe Punkte. Stiel einen Zoll lang, dünn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, grünlich, sehr saftig, süß, angenehm erhaben. Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 14.

408½ Maroko-Pflaume.

In allem ähnlich der vorstehenden Frucht. B. u. Obstf. S. 15.

262. Radlkofer's rothe Frühzwetsche. ⅔ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelblich roth, kleine, graue Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, gröblich, sehr saftig, süß, angenehm erhaben, Stein ablöslich, lanzettförmig, oben und unten spitz, etwas afterkantig, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 15.

341. Lallinger's Königspflaume. ⅔ Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, unbeständig, meistens eiförmig, rothbraun, mehr dunkelviolett, oft fast schwarz, röthlich gelbe Punkte, Stiel zehn Linien lang, dick, meistens gerade, rostig, stark behaart, Fleisch weißgelb, glänzend, härtlich, überfließend, zuckersüß, recht lieblich erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, oben rund, unten stumpfspitz, afterkantig. B. u. Obstf. III. H. S. 16.

205. Königin Victoria. Nr. 2. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, oval, braunroth mit weißgrauen Punkten, Stiel behaart, einen Zoll lang, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, überaus süß, erhaben aromatisch, Stein gut ablöslich, einseitig oval, unten mehr spitz, als oben, afterkantig, Baum sehr tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 17.

224. Isabella. Anf. Sept. II. Rang.

Groß, rothblau, zylinderartig, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch fast gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, stark behaart, Fleisch gelblich-weiß, glänzend, härtlich, etwas gröblich, nicht allzu saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, oval-umgekehrt eiförmig, Breite in der Mitte, oben und unten spitz, afterkantig. Baum tragbar, kräftig. Blüthen frühe, groß. L. II. H. S. 190.

181. Violette Kaiserpflaume mit bunten Blättern.

II. Rang.

Groß, ungestaltet oval, rothblau, Stiel kurz, behaart. Der Baum hat weißgelbgefleckte Blätter, mangelhafte Blüthen, die selten Frucht ansetzen. L. II. H. S. 103.

56. Violette Kaiserin. ½ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, oben und unten spitzig, violettblau, Stiel mittellang, behaart, Fleisch goldgelb, fest, fein, sehr saftreich, sehr edel zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig eiförmig, afterkantig. Baum groß, reichlich tragbar. L. II. H. S. 104.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

41. Katalonischer Spilling. Juli, Aug. II. Rang.

Klein, kurz umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, weich, saftig, ziemlich angenehm süß, Stein ablöslich, oval, oben kurz scharfspitzig, unten stumpfspitz, afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich, daher selten voll, frühe große Blüthen. L. II. H. S. 106.

65. Gemeiner gelber Spilling. 1/3 Aug. III. Rang.

Prunus lutea Bechst.

Klein, gelb, länglich-oval, oben und unten spitzig, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, etwas fest, saftig, süß, ohne Erhabenheit, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig. Baum sehr groß, fruchtbar. L. II. H. S. 109.

172. Doppelter Spilling. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, walzenförmig-oval, grünlich-gelb, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, fest, saftig, angenehm süßweinig, Stein unablöslich, lanzettförmig-oval, oben scharf-, unten stumpfspitz, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Eine Art. L. II. S. 111.

315. Burhardt's gelbe Frühzwetsche. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, gelb, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelb, süßerhaben, Stein klein, löslich, lanzettförmig, Baum mittelgroß, fruchtbar. B. u. Obstf. S. 66.

163. Gisborne's Zwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig oval, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, süß, Stein löslich, afterkantig, Baum fruchtbar. B. u. Obstf. I. H. S. 68.

351. Kook's neue Diaprée. 2/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, Stiel mittellang, behaart, Fleisch zart, strahlig, Stein löslich, einseitig, oval, afterkantig. B. u. Obstf. I. H. S. 67.

10. Gelbe Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, grünlich-gelb, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch gelb, saftig, zart, schmelzend, angenehm feinweinsäuerlich-süß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitzig, stark gedrückt. Baum sehr groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1845. S. 284.

398. Bernstein Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Gut, mittelgroß, gedrückt oval, hellgelb, Stiel lang, kahl,

hellgrün, Stein unablöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig. Baum groß, fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 70.

394. Graf Gustav von Egger. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Groß, gut eiförmig, hellgelb, Stiel lang, haarig, dick, Fleisch weißgelb, löslich, saftig, sehr edel, Stein oval, afterkantig, Baum gemäßigt. B. n. Obstf. I. H. S. 71.

329. Wahre prachtvolle Hulling. $^1/_2$ Sept. I. Rang.

Sehr groß, oval, grünlichgelb, Fleisch sehr edel, süß, Stein ablöslich, Baum charakteristisch große, dicke, zurückgebogene, ovale Blätter, jedoch mäßig tragend. Monatschr. 1856. S. 410.

43. Reizensteiner gelbe Zwetsche. E. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, an der Sonnenseite hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, zart, etwas durchsichtig, saftig, sehr süß, eigenthümlich aromatisch, Stein unablöslich, lanzettförmig oval. Baum groß, reichlich tragbar. L. I. H. S. 112.

384. Bleeker's gelbe Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Groß, gelb oval, röthliche, weißliche Punkte, Stiel zwölf Linien lang, dünn, kurz behaart, rosenroth angelaufen, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig, nicht sehr saftig, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum dauerhaft fruchtbar. Fr. Bl. 1852. S. 292.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

392. Georgswalder Diaprée. E. Aug. II. Rang.

Eine gelblich-grüne Zwetsche mit unablöslichem Stein.

342. Bingham's Pflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, verschoben-oval, grünlichgelb, schwache, weißliche Punkte, zahlreich rothe Punkte und rothe Flecken fast überall, Stiel elf Linien lang, kaum merklich behaart, dick, Fleisch grünlich-gelb, gröblich, saftig, faserig, weich, glänzend, zuckersüß, aromatisch, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig, Baum stark und tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 19.

384. Bleeker's gelbe Renklode. E. Aug. II. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, wachsgelb, auch grünlich-gelb, röthliche und weißliche Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn, kurz behaart, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig und nicht sehr saftig, Stein ablöslich, oval, Backen rauh, afterkantig, Baum groß und der Fortpflanzung werth. B. u. Obstf. III. H. S. 18.

425. Oulen's Renklode. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Reine-Claude d'Oulens.

Frucht mehr als mittelgroß, gelb, renklodeförmig, rund-oval, oben und unten gedrückt, roth punktirt, Stiel lang, dünn, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, süß, sehr edel, aromatisch, Stein unablöslich, afterkantig, Baum kräftig, tragbar. Eine sehr schöne, liebliche Pflaume, aller Aufmerksamkeit werth. Monatschr. 1861.

Den Baum erhalten von Ad. Papelen zu Weteren in Belgien.

217. Traubenpflaume. A. Sept. III. Rang.

Sehr klein, oval, grün, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, fein weinsäuerlich, Stein unablöslich einseitig oval, oben und unten spitz, etwas afterkantig. Baum gemäßigt, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 115.

23. Grüne gestreifte Zwetsche. $^1/_2$ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dickbauchig, umgekehrt eiförmig, unten spitzig, gelblich-grün, rothgefleckt, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, angenehm-süß, Stein unablöslich, oval, oben abgerundet, kurz, scharfspitz, unten stumpfspitz. Baum klein, nicht tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 204.

92. Grüne Dattelzwetsche. $^1/_2$ Sept. II. Rang.

Ziemlich groß, ungestaltet länglich-umgekehrt eiförmig, gelblich-grün, bisweilen etwas röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleisch gelblich-weiß, etwas fest, sehr saftig, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig lanzettförmig, oben scharf- und verlängert stumpfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 116.

237. Zwetsche von Harvy. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten stumpfspitz, weißlich grün, etwas röthlich, Stiel einen Zoll lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, zart, etwas teigig, saftig, zuckersüß, etwas gewürzt, Stein ablöslich, oben gerundet, unten langspitz, afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. 20.

307. Frühe grüne Zwetsche. Heupflaume. $^1/_2$ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, zwetschenförmig, gelbgrün, oft ganz gelb, weißliche Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünne, behaart, röthlich angelaufen, Fleisch grünlichgelb, weich, überfließend, angenehm aromatisch, süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig spitzig, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 73.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

203. Marmorirte Eierpflaume. $^1/_2$ Sept. II. Rang.

Kaum mittelgroß, fast oval, weißlich gelb, roth angelaufen, schön, gut, Stiel lang, dünn behaart, grün, Fleisch hellgelb, weich, weinartig, Stein gut ablöslich, breit lanzettförmig, Sommerzweige behaart. B. n. Obstf. I. H. S. 77.

38. Zweimal tragende Pflaume. $^1/_3$ Sept. III. Rang.

Klein, oval, grünlich-gelb, bisweilen röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, mattsüß, Stein unablöslich, einseitig, lanzettförmig-oval. Baum klein, empfindlich für Kälte, selten voll. Trägt äußerst selten zweimal. L. II. H. S. 118.

209. Graugrüne Zwetsche. M. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, graugrün, röthlich angelaufen, eiförmig oval, oben und unten gleich gerundet, etwas dicker als breit, voll von weißlichen Punkten, Stiel lang, dünn, Fleisch grünlich gelb, saftig, zart, weich, überaus süß, recht gut, Stein fest am Fleische, oben scharfspitz, Rückenkanten stumpf, Baum groß und sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 76.

403. Lepine. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ziemlich rund, schwarzblau, ablösliches, gelbliches Fleisch, würzig, Baum der Vermehrung werth. Monatschr. 1856. S. 410.

303. Smith's Orleans-Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Groß, oval, dunkelviolett, fast schwarzblau, gelbliche Punkte, Stiel sechs Linien lang, kahl, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, zuckersüß, parfümirt, Stein gänzlich unablöslich, oval, etwas spitz, afterkantig. B. u. Obstf. III. H. S. 24.

283. Urbaneck's schwarze Damaszene. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, schwarzblau, goldfarbene Punkte zahlreich, Stiel zehn Linien lang, dünn behaart, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, angenehm süß, Stein gut ablöslich, verschoben, umgekehrt-eiförmig, oben gerundet, unten charakteristisch vorgeschoben. B. u. Obstf. I. H. S. 80.

II. Klasse.

Die Damaszenen.

Prunus damascena. Prunus insititia.

Mit runden Früchten, gepaarten, selten einzelnen Blüthenstielen, gedrücktem, oben und unten abgerundet stumpfspitzigem, bisweilen aber kurz zugespitztem Steine.

I. Ordnung.

Die zwetschenartigen Damaszenen.

Prunus domestico-damascena.

Mit kahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils zartem, sprödem Holze, dicken, stark markigen Sommerzweigen des Baumes und zartem, sehr saftigem, äußerst süßem Fleische der Frucht. Die Vegetation des Baumes nähert sich jener der wahren Zwetsche.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

89. Schlehenpflaume. L. 1/2 Aug. III. Rang.

Prunus insititia. L.

Klein, eiförmig-rund, schwarzblau, Stiel kahl, mittellang, Fleisch grünlich, härtlich, saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, oval, afterkantig. Baum mittelgroß, strotzend tragbar, frühe, kleine Blüthen. Fr. Bl. J. 1844. S. 213.

159. Lange violette Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, verschoben, kurz eiförmig-oval, violettbraun, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelbgrün, faserig, härtlich, saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben kurz scharfspitz, unten verlängert stumpfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, mittelmäßig fruchtbar. L. II. H. S. 122.

77. Die Brugnoller Pflaume von Tours. E. Aug. III. Rang.

Klein, oval, nach unten etwas verjüngt, dunkelblau, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, zart, weich, saftig, fein weinsäuerlich-süß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitz, etwas afterkantig. Baum klein, Blüthen frühe. L. II. H. S. 135.

248. Blaue Krieche mit halbgefüllter Blüthe. 1/2 Sept. III. Rang.

Klein, rund-oval, dunkelblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch grünlich, angenehm süß, Stein unablöslich, oben gerundet, unten stumpfspitz. Baum mittelgroß, tragbar. Ohne Werth. L. II. H. S. 127.

322. Kirke's Pflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig-rund, dunkelviolett, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, schmelzend, saftreich, erhaben aromatisch zuckersüß, Stein ablöslich, klein, gedrückt oval, oben rund, unten spitz. Baum kräftig, scheint fruchtbar zu sein. Ist zu empfehlen. Fr. Bl. J. 1844. S. 214.

299. Blaue Weinpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Klein, ovalrund, schwarzblau, Stiel lang, Fleisch gelblich, mäßig saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, ovalrund, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Eine gute Sorte der sogenannten Kriechen. Fr. Bl. J. 1844. S. 351.

410. Hauffer's Königspflaume. M. Sept. I. Rang.

Groß, ovalrund, dunkelviolett, fast schwarzblau, gelbe Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn und behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, zwetschenartig, süß, weinsäuerlich, angenehm, Stein ablöslich, oben abgerundet, Baum allgemein zu empfehlen. B. u. Obstf. III. H. S. 23.

175. Hauptmann Kirchhof's Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Klein, rundlich, dunkelviolett, zahlreiche, goldfarbene Punkte, gut, Stiel mittellang, kahl, Fleisch zart, zuckersüß, saftig, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum klein, strotzend tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 81.

140. Dunkelblaue Eierpflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Sehr groß, oval, auffallend dicker als breit, dunkelblau, oft röthliche Punkte, schön, Stiel sehr lang, dünn, schwach behaart, Fleisch blaßgelb, härtlich, kaum merklich säuerlich, Stein unlöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig, Baum groß, selten volltragend. B. u. Obstf. I. H. S. 18 und III. H. S. 58.

306. Herbstpflaume. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, plattrund, nach unten etwas verjüngt, schwarzblau, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, zart, sehr saftig, erhaben süß, Stein ablöslich, oval-rund, afterkantig. Baum gemäßigt, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 230.

182. Meerstrandspflaume. Okt. III. Rang.

Prunus maritima. DC.

Sehr klein, schwarzblau, etwas plattgedrückt-rund, Stiel kahl, mittellang, Fleisch grünlich, säuerlich, matt, Stein unablöslich,

oval. Strauch mittelgroß, nicht tragbar. Eine Art aus Nordamerika. Fr. Bl. J. 1844. S. 230.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

103. Rothe Nektarine. M. Aug. I. Rang.

Groß plattgedrückt-rund, rothbraun, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, brüchig, sehr saftig, süß-weinig-erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, nach unten verjüngt, etwas afterkantig. Baum groß, nicht tragbar. Lachend schöne, recht gute Frucht. L. II. H. S. 128.

314. Behren's Königspflaume. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Groß, gedrückt rundlich, violettblau, fast schwarzblau, goldfarbene Punkte, schön, Stiel mittellang, dünn, kahl, Fleisch gelb, zart, aromatisch, sehr saftig, Stein ablöslich, oval, sehr empfehlenswerth. B. n. Obstf. I. H. S. 90.

253. Gustav Berlet's Frühdamaszene. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, rothblau, gelbfarbene Punkte, auch Streifen, Stiel sehr lang, dünn, kahl, Fleisch gelblich weiß, angenehm, süß, Stein ablöslich, verschoben oval, Baum kräftig, strotzend tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 22.

74. Mayer's rothe Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, ziemlich rund, braunroth, Stiel dünn, schwach behaart, Fleisch hellgelb, fein säuerlich, sehr saftig, Stein löslich, groß, oval, bisweilen afterkantig, Baum groß, strotzend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 89.

1. Rothe Kirschpflaume. $^1/_2$ Aug. III. Rang.

Prunus cerasifera Ehrh.

Fast mittelgroß, plattgedrückt-rund, kirschroth, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas durchsichtig, sehr weich, saftig, mattsüß, Stein unablöslich, oval. Baum mittelgroß, selten reichlich tragbar. Eine Art aus Nordamerika. L. II. H. S. 130. B. n. Obstf. III. H. S. 156.



Oecc
1110

Oecon.
1116 x

Oecon.

1116 L

Siegel

1122

Vollständige Uebersicht

aller von dem Verfasser kultivirten und in verschiedenen Werken beschriebenen

Pflaumen

mit

ihren Charakteren.

Von

Dr. G. Liegel,

Apotheker zu Braunau am Inn, Besitzer der großen goldenen Civil-Ehren-Medaille mit Oehr und Band. Mitglied der k. k. ökonomischen Gesellschaft in Wien, des k. k. mährisch-schlesischen Obst-, Wein- und Gartenbau-Vereins in Mähren zu Brünn, des k. k. pomologischen Vereins in Böhmen zu Prag, der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Oesterreich ob der Enns und dem Herzogthume Salzburg, der k. bayer. allgemeinen praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf. Korrespondirendes Mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern zu München, der k. k. und ständischen Ackerbau-Gesellschaft in Kärnthen zu Klagenfurt, der k. k. Ackerbau-Gesellschaft in Steyermark zu Grätz, der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien, der k. ungarischen, ökonomischen Gesellschaft in Pesth, der herzogl. sächsischen, pomologischen Gesellschaft in Altenburg, der k. bayer. botanischen Gesellschaft in Regensburg, des Vereins zur Förderung des Gartenbaues in den k. preußischen Staaten zu Berlin, des herzogl. Gartenbau-Vereins in Thüringen zu Gotha, der k. böhmischen Gartenbau-Gesellschaft in Prag, des k. bayer. ökonomischen Vereines in München, des k. belgischen Vereins für Pomologie in Brüssel, der k. schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau. Ehrenmitglied des Vereins zur Förderung des Gartenbaues im Herzogthume Braunschweig, des Vereins für Pomologie und Gartenbau zu Meiningen, des Vereins für Gartenbau und Feldwirthschaft in Koburg, der Flora-Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden, der k. bayerischen praktischen Feld- und Gartenbau-Gesellschaft der bayerischen Pfalz zu Neustadt an der Haardt, des Vereins für Landwirthschaft und Gartenbau des Kantons Zürich.

Regensburg.

Druck und Verlag von Georg Joseph Manz.

1861.

280

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Seinen hochgeschätzten, pomologischen

Freunden und Pflaumen-Liebhabern

widmet

mit innigster Verehrung und Hochachtung

dieses Heft der Pflaumen

der Verfasser.

Anleitung zum richtigen Einsammeln und Präpariren

Vorrede.

Die Beschreibungen meiner angepflanzten und kritisch untersuchten Pflaumen erschienen in einem sehr langen Zeitraume in verschiedenen Werken: Im Frauendorfer Obstfreund, in den vereinigten Frauendorfer Blättern, in meiner systematischen Anleitung zur Kenntniß der Pflaumen II. Heft, in meiner Beschreibung neuer Obstsorten I. und III. Heft, in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau von J. G. Oberdick und Eduard Luckas.

Um nun diese zerstreut liegenden Beschreibungen in ein Ganzes zu bringen, entwarf ich diese vollständige Uebersicht aller von mir beschriebenen Pflaumen. Es sind darin die Hauptmerkmale der Frucht aufgezeichnet mit einer Citation der Beschreibung, in welchem Werke sie niedergelegt ist. Es ist ihr ein vollständiges Register beigegeben, um eine schnelle Uebersicht zu haben, welche Früchte beschrieben sind.

Der Verfasser hat aus allen Ländern seine Pflaumen gesammelt, hat sie sämmtlich großgezogen, den Baum und

die erhaltene Frucht untersucht, geprüft und kritisch beschrieben. Mehr als fünfzig Früchte, von meist ausgezeichneter Qualität hat derselbe aus dem Steine selbst gezogen, und berühmten Pomologen und Pflaumenliebhabern gewidmet.

Durch meine Pflaumenpflanzungen wurden viele sehr edle Früchte verbreitet, die mir durch die Länge der Zeit viele Bekannte und Freunde zuführten, denen ich nun für ihre Liebe und für ihr Zutrauen herzlich danke.

Man hat erst kurze Zeit eigentlich den hohen Werth der Pflaumen kennen gelernt, es gibt davon nun recht viele, eifrige Verehrer. Eine zuckersüße, vom Safte überfließende, vom Steine gut lösliche, aromatische Pflaume ist eine herrliche, kostbare Frucht, die nicht nur allein dem Steinobste, sondern auch überhaupt allem Obste den Rang streitig macht. Der große französische Obstkenner Quintinye,*) spricht sich offen aus, daß die Perdrigons-, die Katharinen- und Aprikosenpflaumen die besten Früchte der Welt seien. Unter allen Obstgattungen haben die Pflaumen den meisten Zuckerstoff und ein eigenthümliches Aroma von einem edlen und hohen Geschmacke; sie ersetzen in ungünstigen Jahren, da sie sehr tragbar sind, Pfirsiche und Aprikosen, theilweise selbst Aepfel und Birnen, und haben den Vorzug, daß sie vom Ende Juli bis Ende Oktober ihre Früchte ununterbrochen vom besten Wohlgeschmacke liefern. Getrocknet geben sie köstliche Gerichte.

Bei einer vollkommenen Pflaume fordert man:

---

*) Instruction pour les Jardins frutiers et potagers etc. Par. M. de la Quintinye. Paris 1690 p. 191.

1. Daß sie vor oder nach der Reifzeit der gemeinen Zwetsche zeitige.

2. Daß sie fest am Baume hänge, und nicht leicht abfalle.

3. Daß sie im Regen gar nicht, oder doch nicht leicht aufspringe.

4. Daß sie ein etwas festes, härtliches Fleisch habe.

5. Daß sie sich vom Steine löse.

6. Daß sie süß und edel aromatisch sei.

7. Daß sie vom Saft überfließe. —

8. Große Früchte zieht man den kleinen vor.

9. Frühpflaumen haben den Vorzug vor späteren.

10. Spätpflaumen sind wieder vorzüglich, sobald die gemeine Zwetsche vorüber ist.

In Deutschland verlieren alle Pflaumen von ihrem Werthe, sobald die gemeine Zwetsche am Markte erscheint; erst nach ihrer Reifzeit erhalten die Spätpflaumen wieder ihren hohen Werth.

Nebstdem, daß die Pflaumen durch die Prünellen und die gedörrten Zwetschen, sowie durch den Slibowitzer einen ausgebreiteten Handelsartikel geben, so enthält unter allem Obste die gemeine Zwetsche auf die Gesundheit des Menschen die meiste Wirkung.

Ich glaube nun meine Pflaumenarbeiten so ziemlich abgeschlossen zu haben; was ich künftig von den Früchten der vorräthigen noch ungeprüften Pflaumenstämme beschreiben werde, wird in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau erscheinen.

Ich mache hiemit bekannt, daß ich meine Obstbaumpflanzung durch Kauf meinem Gärtner, Herrn Au-

gustin Keindl, der mir länger als dreißig Jahre fleißig und getreu, sowie in Allem verläßlich beigestanden ist, übergeben habe. Diese wird durch meine Mitwirkung und Uebersicht in dem nämlichen Zustande erhalten, ergänzt, richtig gepflegt und davon die neuen Sorten auf ihre Aechtheit und Anwendbarkeit auf das hiesige Klima geprüft, wie es früher in meinen Anlagen zu geschehen pflegte. Zuschriften können unter meiner oder des Herrn Keindl's Firma gemacht werden.

Braunau am Inn im November 1860.

Dr. G. Liegel,
Apotheker.

Inhalt.

Seite

Vorrede VII

Die Pflaume.

I. Klasse.

Die Zwetsche.

I. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 1
II. „ mit rothen Früchten 6
III. „ mit gelben Früchten 13
IV. „ mit grünen Früchten 17
V. „ mit bunten Früchten 18

II. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 19
II. „ mit rothen Früchten 25
III. „ mit gelben Früchten 25
IV. „ mit grünen Früchten 27
V. „ mit bunten Früchten 29

II. Klasse.

Die Damaszene.

I. Ordnung.

I. Unterordnung mit blauen Früchten 31
II. „ mit rothen Früchten 33
III. „ mit gelben Früchten 38
IV. „ mit grünen Früchten 44
V. „ mit bunten Früchten 47

Inhalt.

II. Ordnung.

		Seite
I.	Unterordnung mit blauen Früchten	48
II.	„ mit rothen Früchten	53
III.	„ mit gelben Früchten	59
IV.	„ mit grünen Früchten	62

Notizen.

Besondere Eigenschaften einiger Pflaumen	64
Ueber den Werth einer Pflaumensteinsammlung	67
Pflaumen, die gegenwärtig angepflanzt sind	69
Register	73

Vollständige Uebersicht

der

Pflaumen.

Kunstausdrücke.

Mittelgroß ist bei den Zwetschen, die gemeine Zwetsche, bei den Damaszenen, die große grüne Renklode, im Verhältniß zu diesen Früchten steht klein, sehr klein, groß, sehr groß. Der Stiel ist kurz, wenn er nicht 6 Linien mißt, derselbe ist sehr lang, wenn er 12 Linien und darüber mißt, was zwischen diesen liegt, ist lang, mittellang. Unten ist der Stiel, Oben ist der Kopf, der Nabel, der Stempelpunkt. Plattgedrückt ist die Frucht, wenn sie am Kopfe und Stiele gedrückt ist, so, daß die Breite und Dicke die Höhe übertrifft, gedrückt oder zusammengedrückt ist sie, wenn die beiden Backen, der Rücken oder der Bauch flach gedrückt sind. Ueber den Rücken läuft die Naht, gegenüber liegt der Bauch, die Backen bilden die beiden Seiten, den Durchmesser der Backen nennt man die Dicke der Frucht, das Ausmaaß vom Rücken zum Bauch die Breite, vom Stiel zum Kopfe die Höhe. Afterkanten des Steines nennt man die Erhabenheiten, welche über die Mitte der Backen von unten nach oben laufen.

Abkürzungen.

I. II. III. R.	heißt	I. II. III. Rang.
Obstb. Fr.	„	Frauendorfer Obstbaumfreund.
L. II. H. S.	„	Liegel's systematische Anleitung zur Kenntniß der Pflaume II. Heft.
Fr. Bl.	„	Vereinigte Frauendorfer Blätter.
B. n. Obstf.	„	Beschreibung neuer Obstsorten I. III. Heft.
Monatschr.	„	Pomologische Monatschrift.

Die Pflaume. Prunus.

I. Klasse.

Die Zwetsche. Prunus domestica.

Mit länglich-eiförmigen Früchten.

Mit einzelnen und gepaarten Blüthenstielen, stark gedrückten, oben und unten mehr und weniger spitz verlängertem Steine.

Die Höhe muß in die Augen fallen und gegen die Dicke und Breite wenigstens mehr als eine Linie messen. Bei sehr kleinen Früchten entscheidet das Augenmaß und die Form des Steines.

I. Ordnung.

Die wahre Zwetsche.

Prunus domestica vera.

Mit kahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils etwas wilder Vegetation des Baumes, mit Dornen in der Jugend, mit zähem, sehr hartem Holze und härtlichem, süßem, etwas weinsäuerlichem Fleische der Frucht.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

93. Nickitaer blaue Frühzwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Gus Erik.

Klein, etwas eiförmig, nach unten etwas dicker. Rücken erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, zart, saftig, süß, ohne Parfüm, Stiel lang, fast kahl, Stein unablöslich, verschoben, oval, oben

spitziger, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strotzend tragbar, frühe, kleine Blüthe. Aus Nickita in der Krim. L. II. H. S. 2.

162. Echte Haferpflaume. ½ Aug. III. Rang.

Klein, oval, schwarzblau, Fleisch grünlich-gelb, fest, süßlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, oben scharf spitzig. Baum groß, treibt gerne Ausläufer, die Steine keimen gerne. Eine Krieche. L. II. H. S. 4.

100. Wahre Frühzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, etwas verschoben oval, unten etwas kleiner, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, dunkelblau, Fleisch gelb, härtlich, erhaben, zuckersüß, Stiel mittellang, fast kahl, Stein ablöslich, oben und unten fast gleichspitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, empfindlich für Kälte, mäßig tragbar, sehr späte Blüthe, Aeste in sehr spitzigen Winkeln. Vortreffliche Frucht. L. II. H. S. 6.

261. Wangenheim's Pflaume. ⅓ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, nach unten etwas verjüngt, dunkel-violett, Stiel mittellang, fast kahl, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftreich, süßerhaben, Stein löslich, einseitig oval, Rücken mehr erhoben, Breite mehr nach unten. Baum groß, tragbar. Aehnlich in Allem der wahren Frühzwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 101.

240. Alibuchari. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, dunkelviolett, oval, oben spitzig, Stil fast kahl, Fleisch gelblich-grün, härtlich, saftig, süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, verschoben, lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum kräftig. Aus Persien. Fr. Bl. J. 1844. S. 101.

213 ½ Donauer's Zwetsche. I. Rang.

Ist ebenfalls eine sehr edle, gemeine Frühzwetsche, häufiger Vermehrung werth. B. u. Obstf. Heft I. S. 14.

238. Große blaue Nickitaer Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, schwarzblau, kurz, eiförmig-oval, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftig, sehr edel

süß erhaben, Stein unablöslich, einseitig oval, oben und unten spitz. Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 7.

344. Buhl Eltershofen. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, Fleisch weißgelb, süßerhaben, edel, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, einseitig oval, afterkantig. Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 11.

129. Liegel's Frühzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr edle, gemeine Zwetsche. B. n. Obstf. I. H. S. 11.

150. Herrenhäuser Eierpflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, langoval, Fleisch dunkelblau, gut ablöslich, zuckersüß, erhaben aromatisch. Baum tragbar. Monatsch. 1858. S. 281.

2. Violette Dattelzwetsche. Liegel. 1/5 Sept. II. Rang.

Prunus austriaca.

Groß, länglich verschoben, umgekehrt eiförmig, nach unten eine lange, stumpfe Spitze, Rücken stark erhoben, dunkelviolett, Fleisch etwas grünlich-gelb, härtlich, gröblich, angenehm süß-weinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten lang vorgeschoben, stumpfspitzig, Breite etwas mehr nach oben. Baum groß mit Dornen, nicht empfindlich, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 10.

160. Dörrell's neue große Zwetsche. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, Rücken nur etwas mehr erhoben, Breite stark nach unten, dunkelviolett, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, saftig, angenehm süß, bisweilen fein säuerlich, Stiel ziemlich lang, kahl, Stein unablöslich, einseitig eiförmig, oben scharf-, unten stumpf-spitzig, Breite nach unten. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. 12.

94. Cooper's große, rothe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang.

Groß, oval, dunkelviolett, gezuckert, sehr edel. Stein ablös-lich, klein. Monatschr. 1856. S. 409.

155. August-Zwetsche. M. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig, schwarzblau, Fleisch weißgelb,

angenehm süß. Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 9.

104. Italienische Zwetsche. ½ Sept. 1. Rang.

Groß, oft sehr groß, unregelmäßig umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpfspitzig, Breite in der Mitte, Rücken nur etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, saftig, erhaben süß-weinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, oben kurz spitzig, unten etwas verlängert stumpfspitzig, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig tragbar. Blätter charakteristisch stark hängend, sehr schmal, lang, etwas steifhaarig. L. II. H. S. 14. Eine ausgezeichnete Frucht.

207. Große blaue Zwetsche von der Worms. ½ Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, ungestaltet umgekehrt eiförmig, unten abgestutzt, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 17.

97. Nickitaer Spätzwetsche. ½ Sept. II. Rang.

Gus al Erik.

Fast mittelgroß, dunkelviolett, umgekehrt-eiförmig, auch oval, um die Mitte fast rund, Stiel mittellang, behaart, Fleisch härtlich, weißgelb, saftig, recht angenehm süß, Stein ablöslich, klein, oval. Baum nicht groß, tragbar. Blüthen klein. Fr. Bl. J. 1844. S. 126.

116. Große englische Zwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, unten spitzig, Breite etwas nach oben, Rücken und Bauch ziemlich gleich erhoben, schwarzblau, Fleisch etwas grünlich-gelb, härtlich, sehr erhaben süß, Stiel lang, kahl, Stein ablöslich, oben abgerundet etwas spitz, unten vorgeschoben stumpfspitz, Breite etwas nach oben. Baum groß, mäßig tragbar, kenntlich durch langspitzige Blätter. Vortrefflich. L. II. H. S. 16.

270. Große Frühzwetsche. M. Sept. I. Rang.

Groß, oft sehr groß, dunkelblau, oval, oben und unten stumpfspitz, flach, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, weinsäuerlich, Stiel behaart, dünn, lang, einseitig, lanzettförmig, oben und unten scharf spitz, Baum kräftig, gesund, trägt selten strotzend. B. u. Obstf. III. H. S. 1.

383. Die Glocke. M. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, schwarzblau, Stiel unten sehr schön, regulär geformt, Zwetschen körnig, recht gut. B. u. Obstf. III. H. S. 2.

190. Neue Agener Pflaume. E. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, kurz oval, oben und unten ziemlich gerundet, Fleisch weißlich, saftig, etwas weich, süß, angenehm, kaum merklich säuerlich, Stiel dünn, kahl, lang, Stein unlöslich, oval, Baum sehr lebhaft, tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 3.

171. Gemeine kleine Zwetsche. ½ Sept. III. Rang.

Prunus exigua Bechst.

Fast klein, oval, Rücken stark erhoben, dunkelblau, Fleisch gelb, weich, saftig, süß-weinig, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, oval, unten spitziger, Baum klein, treibt häufige Ausläufer, dauerhaft, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 19.

364. Ungarische Dattelzwetsche. ⅓ Sept. II. Rang.

Sehr groß, dunkelviolett, länglich umgekehrt eiförmig, nach unten verlängert, umgestaltet, Stiel lang, behaart, Fleisch grünlichgelb, gröblich, glänzend, härtlich, saftig, angenehm süß, Steine ablöslich, einseitig lanzettförmig, schwach afterkantig. Baum groß, tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 22.

71. Siebenbürger-Zwetsche. ½ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas kleiner, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, härtlich, angenehm süßweinsäuerlich, Stiel sehr lang, behaart, Stein unablöslich, oben spitzig, unten verlängert stumpf, Breite in der Mitte. Baum groß, tragbar, große, späte Blüthen. L. II. H. S. 21.

399. Rossy's frühe Hauszwetsche. I. Rang.

Eine etwas frühere gemeine Hauszwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 140.

11. Hauszwetsche, gemeine Zwetsche. I. Rang. L.

Prunus domestica.

Ueberall bekannt. Eine Art. L. II. H. S. 24.

309. Dollaner-Zwetsche. I. Rang.

Eine etwas größere, gemeine Zwetsche. Fr. Bl. J. 1844. S. 140.

334. Wisinger'sche Zwetsche. E. Sept. I. Rang.

Gemeine Zwetsche, groß, gut. B. u. Obstf. S. 13, I. H.

96. Englische Zwetsche. Sept. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, kurz-oval, dunkelviolett, Fleisch goldgelb, härtlich, nicht zu saftig, erhaben zuckersüß, Stiel sehr lang, kahl, Stein ablöslich, oval, oben stumpf-, unten scharfspitzig, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 28.

369. Balaszky's Spätzwetsche. ½ Okt. I. Rang.

Neu, mittelgroß, umgekehrt eiförmig, dunkelblau, sehr edel aromatisch. B. u. Obstf. III. H. S. 3.

60. Unvergleichliche. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, verschoben oval, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, dunkelviolett, Fleisch goldartig-gelb, härtlich, saftig, köstlich erhaben süß, Stiel lang, fast kahl, Stein unablöslich, einseitig oval, oben abgerundet kurzspitzig, unten stumpfspitzig, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. 31.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

288. Rother Spilling. ⅓ Aug. II. Rang.

Klein, oval, nach unten etwas verjüngt, rothblau, Stiel fast kahl, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, süß mit etwas Aroma, Stein ablöslich, einseitig ausgebogen, oval, oben und unten spitz,

Rücken mehr erhoben, etwas afterkantig. Baum klein, kleine Zweige, kleine Blätter, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 21.

227. Rothe, süße Königspflaume. M. Aug. I. Rang.

Groß, umgekehrt-eiförmig, oben flach abgerundet, unten stumpfspitz, hellroth, dunkle Flecke, viele gelbe Punkte, Fleisch weißgelb, glänzend, fasserig, saftig, weich, süß, aromatisch, Stiel lang, dünne, rostig, behaart, Stein ablöslich, oval, oben kurz feinspitz, unten vorgeschoben, stumpfspitz, afterkantig, Backen narbig, Baum mäßig groß, sehr tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 31.

357. Liegel's Zwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, kurz eiförmig, Stiel kurz, kahl, Fleisch um die Haut und den Stein etwas röthlich, sonst gelblich, brüchig, weich, saftreich, ungemein süß erhaben, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 23.

98. Nickitaer Dattelzwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Bardak Erik.

Ziemlich groß, lang umgekehrt eiförmig, schwach rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch gelb, härtlich, angenehm süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, lang umgekehrt eiförmig. Baum stark, mäßig tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 22.

298. Purpurzwetsche. ⅔ Aug. II. Rang.

Groß, fast kreiselförmig, oben schief, platt gedrückt, purpurroth, viele goldfarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht allzu saftig, süß aromatisch, Stiel kurz, kahl, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 4.

25. Spitzzwetsche. E. Aug. II. Rang.

Groß, eiförmig, langspitzig, Breite stark nach unten, blaulichroth, Fleisch gelb, fest, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm weinsäuerlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, lanzettförmig, oben zugespitzt, unten stumpfspitzig, Breite stark nach unten, Baum mittelgroß, mäßig tragbar. L. II. H. S. 33.

8. Rothe Kaiserpflaume. E. Aug. II. Rang.

Sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, Breite in der Mitte, Rücken und Bauch nicht bedeutend verschieden, rothblau, Fleisch weißlich-gelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, erhaben süß, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, länglich, oben stumpf-, unten langspitzig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. 35.

75. Nolten's ungarische Pflaume. Anf. Sept. I. Rang.

Frucht groß, rothblau, lang-oval, mit blaßgelben Punkten und rostigen Flecken, Stiel behaart, mittellang, dick, Fleisch weiß-gelb, härtlich, saftig, süß-aromatisch, Stein ablöslich, länglich, Baum stark, mäßig tragbar. Monatschr. 1861.

Zweige von Herrn Oberdieck, Superintendenten zu Jeinsen bei Hannover.

73. Dörrels neue Purpurzwetsche. Anf. Sept. II. Rang.

Groß, lebhaft roth, umgekehrt eiförmig, dunkle Flecken, viele graue Punkte, Stiel über zwölf Linien lang, rothfärbig, behaart, Fleisch weißgelb, saftig, faserig, weich, angenehm, weinsäuerlich-süß, Stein gut ablöslich, oval, Baum groß, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 32.

367. Porsch's rothe Zwetsche. M. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, regulär, braunroth, Fleisch zart, saftig, zuckersüß, angenehm, Stiel dünn, behaart, Stein unlöslich, einseitig eiförmig, oben scharfspitz, unten stumpf, Baum stark, strotzend, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 25.

313. Schamal's Frühzwetsche. Ende Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, roth, Fleisch gelb, sehr saftig, zuckersüß-aromatisch, unablöslich. Monatschr. 1858. S. 281.

123. Rothes Zeiberl. E. Aug. II. Rang.

Klein, regulär-oval, dunkelroth, Fleisch weißgelb, weich, zart, saftig, angenehm, säuerlich-süß, Stiel lang, fast kahl, Stein ziemlich ablöslich, oval, oben spitzig, unten etwas vorgeschoben stumpf spitzig. Baum klein, strotzend in Klumpen tragbar. L. II. H. S. 38.

136. Wahre Hahnenhode. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, eiförmig, rothbraun, Stiel behaart, sehr lang, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, angenehm fein weinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig. Baum groß, frühe, kleine Blüthen. B. n. Obstf. III. S. 27.

32. Rothe Eierpflaume. E. Aug. II. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, oben stark gerundet, unten spitzig, Rücken höher, Breite ziemlich in der Mitte, geflammt dunkelroth. Fleisch hellgelb, faserig, etwas härtlich, schmelzend, sehr angenehm erhaben, weinsäuerlich-süß, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben kurz scharfspitzig, unten verlängert, stumpfspitzig, Rücken stark erhoben, Breite etwas mehr oben. Baum groß, fast jährlich strotzend tragbar. L. II. H. S. 40.

73. Dörrell's neue Purpurzwetsche. E. Aug. II. Rang.

Eine schöne, große Varietät der rothen Eierpflaume, ihr sehr ähnlich. L. II. H. S. 42.

290. Pflaume von Mimms. E. Aug. II. Rang.

Ebenfalls eine Varietät der rothen Eierpflaume. Fr. Bl. J. 1844. S. 346.

226½ La prune maraichère. Gartenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, eiförmig, Stiel mittellang, feinbehaart, Fleisch hellgelb, glänzend, sehr saftig, etwas härtlich, schmelzend, delikat, süß erhaben, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum klein, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. J. 1847.

147. Agener Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig, umgekehrt eiförmig, oben platt abgerundet, unten stark abnehmend, stumpfspitz, bläulich roth, häufige, goldfarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht saftig, zuckersüß, erhaben, Stiel lang, kahl, dünne, Stein unlöslich, oval, Rücken erhoben, Baum mäßig groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 28.

133. Rothe prachtvolle Huling. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, unten ſtumpfſpitzig, oben flach abgerundet, Rücken etwas mehr erhoben, Breite nach oben, dunkelroth, Fleiſch gelb, härtlich, ſchmelzend, überaus angenehm, eigenthümlich muskatellerartig ſüß, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, einſeitig oval, oben zugeſpitzt, unten zuſammengedrückt, vorgeſchoben, ſtumpfſpitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte. Baum groß, Blüthen ſtrotzend, klein. Die Frucht zerſpringt im Regen gerne. Köſtlich. L. II. H. S. 43.

121. Geiſepflaume. E. Aug. II. Rang.

Faſt mittelgroß, eiförmig, ſpitzig, roth, ſchöne Frucht mit weißgelbem Fleiſch, ſüß, kaum merklich ſäuerlich, Stein einſeitig eiförmig, langſpitzig, unablöslich, Baum zart, klein. B. u. Obſtſ. I. H. S. 26.

350. Schmidt's rothe Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, braunroth, Fleiſch gelb, etwas härtlich, glänzend, ſaftig, ſüß, erhaben aromatiſch, Stiel dünn, lang, kahl, Stein ablöslich, oval, Baum ſtark, fruchtbar. B. u. Obſtſ. I. H. S. 29.

277. Berlepſch's violette Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ſehr ſchön regulär geformt, oval, nach unten und oben ziemlich gleich abgerundet, violettblau, Fleiſch weißgelb, härtlich, ſehr ſaftig, ſüß, fein, ſehr gut. Stiel lang, dünn, behaart, Stein ablöslich, Baum kräftig, tragbar. B. u. Obſtſ. III. H. S. 5.

255. Rubens' Burgunder Zwetſche. E. Aug. I. Rang.

Groß, oval, oben platt gedrückt, unten verjüngt, ſtumpfſpitz, rothbraun, öfters große, faſt ſchwarze Flecken, goldfarbene Punkte, Fleiſch weißlich, härtlich, aber zerfließend, ſtrahlich, ſüß, edel, erhaben aromatiſch, Stiel dünn, ſehr lang, behaart, Stein ablöslich, zehn Linien lang, oben ſpitz, unten ſtumpfſpitz, Baum kräftig und tragbar. B. u. Obſtſ. III. H. S. 6.

166. Nickitaer Hahnenhode. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast groß, oval, oben zizzenförmig spitzig, unten verlängert spitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte, rothbraun, Fleisch pomeranzengelb, weich saftig, recht angenehm süß, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben lang scharfspitzig, unten vorgeschoben spitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe kleine Blüthen. L. II. H. S. 46.

137. Violette Kaiserpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, oval, oben abgerundet, unten verjüngt, Rücken und Bauch fast gleich, Breite in der Mitte, dunkel-violett, Fleisch weißgelb, fest, nicht zu saftig, sehr erhaben süß, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, oval, oben stumpfspitzig, unten vorgeschoben abgestutzt spitzig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Die Frucht zerspringt im Regen gerne. Vortrefflich. L. II. H. S. 47.

13. Rothe Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, fast oval, unten mehr abgerundet, Breite nur etwas unter der Mitte, Rücken und Bauch ziemlich gleich, rothblau, Fleisch weißgelblich, fest, sehr fein, saftig, überaus süß, köstlich, erhaben, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, oval, oben und unten abgerundet, Rücken wenig erhoben, Breite in der Mitte, auch etwas nach unten, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar, späte kleine Blüthe. Die Frucht zerspringt im Regen sehr gerne. L. II. H. S. 50.

119. Mailändische Kaiserpflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in der Mitte, dunkel-violett, Fleisch gelb, fest, zart, saftig, zuckersüß, äußerst müskirt-aromatisch, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten vorgeschoben, Rücken stark erhoben. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. 50.

57. Violette Jerusalems-Pflaume. ½ Sept. I. Rang.

Sehr groß, rothbraun, eiförmig, oben spitz, unten kurz vorgeschoben spitz, Breite stark nach unten, Rücken höher, Fleisch gelb, gröblich, fest, saftig, angenehm süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, oben langspitz, unten stumpfspitz, Rücken höher, Breite stark unten, Stiel lang, behaart. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. 54.

206. Hackel's große Zwetsche. M. Sept. II. Rang.

Groß, oval, dunkelroth, graue Punkte zahlreich, Fleisch weißgelb, härtlich, etwas zähe, saftig, süß, angenehm aromatisch, Stiel mitteldick, lang, fast kahl, Stein unlöslich, einseitig oval, oben und unten vorgeschoben, stumpfspitz, stark rauh, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 34.

293. Plattrunde Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Fast groß, oval, auf beiden Seiten etwas gedrückt, rothbraun, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlich-gelb, fein, saftig, angenehm süß weinsäuerlich, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum stark, tragbar. Dittrich, Handb. II. Thl. S. 238.

164. Nienburger Eierpflaume. M. Sept. II. Rang.

Groß, kurz umgekehrt eiförmig, violettblau, oben flach abgerundet, unten stumpfspitz, violettblau, auch rothbraun, röthlich graue Punkte, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, zuckersüß aromatisch, Stiel sehr lang, kahl, Stein ablöslich, einseitig oval, oben kurz fein-, unten stumpfspitz, Baum groß, strotzend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 35.

33. Blaue Eierpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, rothblau, umgekehrt eiförmig, oben gerundet, unten verjüngt stumpfspitz, Breite nach oben, Bauch etwas mehr erhoben, Fleisch goldgelb, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm, süß, fein weinsäuerlich, zwetschenartig, Stein ziemlich ablöslich, oben abgerundet, kurz scharfspitz, unten zusammengedrückt, etwas vorgeschoben stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite nach unten, stark afterkantig, Stiel lang, behaart. Baum groß, fast jährlich tragbar, aber selten reichlich. L. II. H. S. 57.

403. Abruzzen-Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Groß, lang, auf beiden Enden spitz, roth, süßsäuerlich, unablöslich. Monatschr. S. 411. 1856.

267. Röthlich-braune Zwetsche. ½ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, rothbraun fast schwarz, Punkte unansehnlich, Stiel neun Linien lang, kahl, dick, Fleisch gelb, härtlich, saftig, süß, gut, etwas matt, Stein ablöslich, verschoben oval, oben abgerundet, etwas spitz, unten stumpfspitzig, afterkantig, Baum stark, fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 36.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

88. Scanarda. ⅓ Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, länglich umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch wachsgelb, sehr fest, saftig, lieblich zuckersüß, Stein unablöslich, lanzett-umgekehrt eiförmig. Baum groß, sehr tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 157.

45. Gelbe Frühzwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Fast groß, etwas orleangelb, stark verschoben oval, oben schief abgerundet, unten etwas mehr stumpf, Rücken erhoben, Breite meistens in der Mitte, Fleisch gelb, weich, sehr saftig, etwas matt süß, Stein ziemlich ablöslich, oval, oben etwas spitz, unten meistens abgestutzt, Rücken höher, Breite in der Mitte, Stiel lang, behaart. Baum mittelgroß, äußerst fruchtbar. L. II. H. S. 50.

79. Kleine gelbe Eierpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, oben platt, unten stumpfspitz. Stiel kurz haarig, Farbe gelb, an der Sonne roth angelaufen, Fleisch gelb, härtlich, aromatisch süß, Stein nicht ganz löslich, oval. Baum groß, fruchtbar. B. n. Obstf. S. 7.

310. Frost's gelbe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang.

Frost Gage.

Frucht sehr groß, umgekehrt eiförmig, gelb, an der Sonne röthlich angelaufen, stark roth punktirt, Stiel kahl, lang, dick,

Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, süß aromatisch, Stein groß, umgekehrt eiförmig, afterkantig, unablöslich, Baum kräftig, fruchtbar. Frost Gage ist eine lieblich gestaltete, sehr schöne, recht gute, dabei sehr große Frucht. Monatschr. 1861.

Zweige erhalten von Herrn Major Buhl Eltershofen in Eltershofen. J. C. Frost ist ein berühmter Baumzüchtler in Pensylvanien in Nordamerika.

21. Gelbe Eierpflaume. Liegel. 1/3 Sept. II. Rang.

Prunns grandissima.

Sehr groß, etwas röthlich-gelb, oval, unten etwas dünner, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch weißgelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, oben spitz, unten vorgeschoben stumpfspitz. Baum groß, recht fruchtbar. Eine Art. L. II. S. 62.

117. Dörrell's neue weiße Diaprée. 2/5 Aug. I. Rang.

Fast klein, gelb, oval, oben mehr abgerundet, Rücken und Bauch fast gleich, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, härtlich, sehr saftig, sehr fein erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, oben spitz, unten stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 66.

114. Wahre weiße Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast klein, gelb, oval, nach unten etwas verjüngt, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, glänzend, saftig, schmelzend, etwas härtlich, vom feinsten, äußerst süßen, aromatisch erhabenen Geschmack, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig. Baum kräftig, mäßig tragbar, kleine späte Blüthe. Sehr gut. B. u. Obstf. III. H. S. 41.

130. Hartwiß's gelbe Zwetsche. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, wachsgelb, einseitig eiförmig, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch strahlig, weißlich-gelb, härtlich, saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, lanzettförmig. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1846. S. 212.

66. Gelbe Marunke. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, Stiel mittellang, kahl, Farbe wachsgelb, Fleisch weißgelb, saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, lanzettförmig, Baum tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 39.

27. Gelbe Jerusalemspflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Sehr groß, wachsgelb, kurz oval, oben flach abgerundet, unten vorgeschoben, spitzig, Breite meistens etwas nach oben, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, saftig, gröblich, sehr süß und angenehm, Stein ablöslich, oben stark gerundet, unten vorgeschoben abgestutzt spitz, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum groß, selten volltragend. Blüthen groß. L. II. H. S. 64.

349. Jahn's gelbe Jerusalemspflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Groß, kurz oval, wachsgelb, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch hellgelb, sehr saftig, etwas härtlich, süß-erhaben-aromatisch, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitzig, etwas afterkantig. Baum groß, mäßig tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 189.

373. Rudolfs-Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Fast groß, umgekehrt eiförmig, wachsgelb, weißliche Punkte, selten Röthe, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, glänzendstrahlig, härtlich, saftig, zuckersüß, etwas aromatisch, Stein nicht ganz ablöslich, lang, umgekehrt eiförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, afterkantig, Baum groß, mittelmäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 40.

177. Gelbe Prünelle. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, gelb, süß, gewürzt, hart ablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. 8.

395. Topas. E. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, süßsauer, Stein nicht gut löslich. Monatschr. 1856. S. 411.

371. Waterloo-Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, auf beiden Seiten stark gedrückt, Stiel sehr lang, fast kahl, Farbe grünlich-gelb, roth punktirt-

gefleckt, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, sehr edel aromatisch, zuckersüß, Stein löslich, oval, Baum groß, fruchtbar. Monatschr. 1855. S. 281.

229. Pomeranzenzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, Stiel lang, kahl, Farbe goldgelb, roth marmorirt, sehr schön, Fleisch gelb, härtlich, saftig, sehr edel, süß, Stein löslich, oval, Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 9.

220. Coë's rothgefleckte Pflaume. E. Sept. I. Rang.

Coë's Golden Drop Plum.

Sehr groß, kurz umgekehrt, eiförmig, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch ziemlich gelb, zart, weich, etwas faserig, überfließend vom Saft, äußerst erhaben aromatisch, süß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, afterkantig. Baum stark, tragbar. Große frühe Blüthe. Gute Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. 46.

84. Phiolenartige gelbe Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, saftig, zart, erhaben-süß, Stein unablöslich lanzettförmig, unten langspitz, etwas afterkantig. Baum in allen Theilen klein, mäßig tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 190.

59. Große gelbe Dattelzwetsche. Okt. III. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, oben schief abgerundet, unten verjüngt stumpfspitz, Rücken und Bauch nicht stark verschieden erhoben, Breite nach oben, wachsgelb, Stiel sehr lang, fast kahl, Fleisch gelb, härtlich, saftig, vollkommen süß, aber matt, Stein unablöslich, oben stumpfspitz, unten verlängert zackig spitzig, Breite nach oben, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe, große Blüthe. L. II. H. S. 68.

355. Gelbe Spätzwetsche. Sept. Okt. I. Rang.

Eiförmig, spitzig, mittelgroß, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, lieblich aromatisch zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 49.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

307. Heupflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Bitschen Erik.

Mittelgroß, oval, Stiel sehr lang, behaart, Farbe gelbgrün, Fleisch grünlich-gelb, weich, sehr saftig, angenehm süß-weinsäuerlich, Stein löslich, eiförmig-spitz, Baum mittelgroß, sehr tragbar. Zerspringt im Regen nicht. B. n. Obstf. I. H. S. 73.

289. Buel's Lieblingszwetsche. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, röthlich angelaufen, grün, zerspringt im Regen gerne. Stiel zehn Linien lang, kahl, etwas eingesenkt, Fleisch grünlich gelb, saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten lang, scharfspitz, Baum häufiger Vermehrung nicht werth. B. n. Obstf. III. H. S. 10.

202. Große grüne Weinpflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, gelblich-grün, walzenförmig-oval, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, zart, überfließend vom Saft, sehr angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, unten vorgeschoben stumpfspitz, oben abgerundet feinspitzig, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, stark afterkantig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. 71.

80. Grüne Inselpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Fast mittelgroß, gelblich-grün, etwas birnförmig, unten spitzig, oben stumpf, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in der Mitte, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelbgrün, fein, saftig, schmelzend, erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, unten etwas mehr als oben spitzig, Rücken stark gewölbt, Breite in der Mitte. Baum groß, nicht tragbar. L. II. H. S. 73.

3. Italienische grüne Zwetsche. 1/3 Sept. II. Rang.

Groß, gelbgrün, walzenförmig oval, Stiel lang, behaart,

Fleisch gelblich-grün, etwas fest, sehr zart, saftig, erhaben fein, fast übermäßig zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig, oben und unten fast gleich spitz, Rücken mehr erhoben, Breite in der Mitte, Baum groß, dauerhaft, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 75.

200. Holländische Zwetsche. ½ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, grün, Stiel mittellang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, saftreich, äußerst zuckersüß, Stein unablöslich, lanzettförmig, Baum mittelgroß, selten volltragend. Fr. Bl. J. 1844. S. 204.

156. Kleine grüne Zwetsche. ⅓ Sept. III. Rang.

Sehr klein, regulär oval, gelblich-grün, Stiel lang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, zart, saftig, angenehm süß-säuerlich, Stein fast ablöslich, oben und unten spitzig, Rücken höher, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig fruchtbar. L. II. H. S. 77.

200. Holländische Zwetsche. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grün, zwetschenförmig, Stiel mittellang, behaart, Fleisch unlöslich, grünlich, mattsüß, Stein oval, Baum unfruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 75.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

302. Oberdeck's gestreifte Eierpflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, gelb, roth angelaufen, umgekehrt eiförmig, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, sehr angenehm süß, Stein löslich, lanzettförmig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 50.

II. Ordnung.

Damaszenenartige Zwetsche.

Prunus damasceno-domestica.

Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

Mit größtentheils mehr zahmer, damaszenenartiger Vegetation des Baumes und zarterem, weicherem Fleische der Frucht.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

339. Sämling der Johannispflaume. I. Gen. III. Baum. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, dunkelviolett, Stiel lang, feinbehaart, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, süß-fein-weinsäuerlich erhaben, Stein ablöslich, eiförmig, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, äußerst tragbar. Die Frucht in Allem der gemeinen Zwetsche ähnlich. Fr. Bl. J. 1844. S. 197.

428. Firbas's frühe Schütterhaferin. ½ Aug. I. Rang.

Klein, schwarzblau, eiförmig, aromatisch-süß, Stein ablöslich, Baum mittelgroß, tragbar. P. Monatschr. 1858. S. 8.

257. Lucas's Frühzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, dunkelviolett, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, edelsüß. Stein löslich, oval, Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 1844. S. 197. P. Monatschr. 1855. S. 155.

320. Kleine blaue Frühzwetsche. ½ Aug. I. Rang.

Klein, oval, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, sehr edelsüß, Stein unlöslich, lanzettförmig, Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 52.

274. Frühe englische Zwetsche. ½ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, umgekehrt eiförmig, Stiel kurz, kahl, Fleisch gelblich, saftig, zuckersüß erhaben, Stein unlöslich, umgekehrt eiförmig, Baum tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 11.

337. Blaue Kaiserin. ½ Aug. II. Rang.

Groß, unregulär oval, schwarzblau, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, saftig, süßweinig, Stein unlöslich, oval, Baum kräftig. B. n. Obstf. III. H. S. 12.

407. Rodt's frühe große Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, dunkelroth, oval, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb,

saftig, erhaben süß, Stein löslich, lanzettförmig, Baum stark, sehr fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 14.

332. Bazalicza's große blaue Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, Stiele lang, behaart, Fleisch gelb, faserig, weich, zart, süß-feinweinsäuerlich, Stein unablöslich, lanzettförmig, afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar, Blüthen groß, frühe. Die Stielhöhle hat charakteristisch einen knorpelartigen Ring. B. n. Obstf. III. H. S. 53.

124. Violette Diaprée. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, Bauch mehr aufgeworfen, Breite stark nach unten, schwarz-blau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb-weiß, glänzend, härtlich, sehr lieblich, erhaben-süß, Stein ablöslich, eiförmig, unten stumpf-, oben scharfspitzig, Bauch erhoben, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strotzend tragbar. Vorzüglich. L. II. H. S. 79.

9. Große Zuckerzwetsche. Ungarische Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, schwarzblau, oval, auf beiden Seiten stark gedrückt, Rücken erhoben, Breite in der Mitte, auch etwas nach oben, Stiel ziemlich lang, kahl, Fleisch weiß-gelblich, etwas fest, glänzend, sehr saftig, ungemein erhaben süß, Stein ablöslich, verschoben lang-oval, oben spitzig, unten etwas abgestutzt, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in der Mitte. Baum groß, selten recht volltragend, Blüthe früh, Frucht ausgezeichnet. L. II. H. S. 81.

210. Eugen Fürst's Frühzwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, schwarzblau, röthliche Punkte, Stiel neun Linien lang, mäßig dick, kurz behaart, rothfarbig, Fleisch grünlich weiß, etwas härtlich, sehr saftig, äußerst süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, lanzettförmig, oben spitz, unten stumpfspitz, Baum mittelgroß, äußerst tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 58.

228. Jesum Erik. Ende Aug. III. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, süß, gut, Fleisch ablöslich, Baum ohne Werth. B. n. Obstf. III. H. S. 13.

388. Donauer's frühe Pflaumenzwetsche. 1/3 Sept.
I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, dunkelviolett, süß, zwetschenartig, gewürzt, Fleisch unablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. 13.

146. Pflaume ohne Stein. E. Aug. III. Rang.

Sehr klein, eiförmig, Rücken etwas höher, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich-grün, zähe, angenehm sauer, Mandel oft taub, ablöslich. Baum mittelgroß, mäßig fruchtbar, Blüthe spät und klein. L. II. H. S. 84.

118. Melnicker Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, gut eiförmig, unten stark stumpf, oben ziemlich spitzig, Rücken höher, Breite weit unten, Stiel ziemlich lang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, sehr süß und recht angenehm, Stein nicht gut löslich, verschoben oval, unten stumpf-, oben kurz-scharfspitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte, Dicke nach unten. Baum mittelgroß, fruchtbar. L. II. H. S. 86.

64. Kleine Zuckerzwetsche. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast klein, oval, unten etwas verjüngt, Breite in der Mitte, Rücken und Bauch fast gleich, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich, härtlich, erhaben süß-feinweinsäuerlich, Stein ablöslich, oben scharf-, unten stumpfspitzig, Rücken etwas höher, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. II. H. S. 88.

67. Diamantpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, oval, Stiel mittellang, kahl, Fleisch gelb, weich, nicht zu saftig, süßweinartig, Stein unlöslich, oval, Baum kräftig, reichlich tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 57.

450. Riesenzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, oft sehr groß, oval, schwarzblau, Fleisch gelb, saftig, härtlich, süß aromatisch, Stein gut löslich, Baum sehr tragbar.

Die Frucht zerspringt im Regen niemals und hängt fest am Baum. P. Monatschr. 1858. S. 281.

402½ Rodt's blaue Zwetsche. ½ Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpfspitz, dunkelviolett, Punkte wenig bemerkbar, Stiel neun Linien lang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, erhabenaromatisch, Stein ablöslich, afterkantig, Baum kräftig, sehr tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 13.

326. Wildling von Shropshire. ⅓ Sept. II. Rang.

Groß, eiförmig, schwarzblau, Stiel mittellang, fast kahl, Fleisch gelblich-grün, fest, saftig, süß-weinsäuerlich, Stein unablöslich, lanzettförmig. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. B. n. Obstf. III. H. S. 50.

275. Bischofsmütze. ½ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, oval, Stiel mittellang, kurz behaart, Fleisch härtlich, grünlich-gelb, saftreich, erhaben zuckersüß, Stein einseitig oval, unablöslich. Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 59.

85. Ransleben's Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dunkelblau, verschoben oval, oben nur etwas dünner, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte, Stiel fast sehr lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, recht angenehm süßsäuerlich, Stein unablöslich, oval, oben und unten stumpfspitz, Baum groß, fruchtbar. L. II. H. S. 89.

111. Brünner Zwetsche. Sept. Okt. II. Rang.

Sehr klein, schwarzblau, eiförmig, fast oval, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, angenehm feinweinsäuerlich-süß, Stein nicht gut ablöslich, oval, unten stumpf-, oben kurzspitz, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum klein, tragbar, frühe, kleine Blüthen. L. II. H. S. 91.

51. Dunkelblaue Kaiserin. Okt. II. Rang.

Fast groß, schwarzblau, oval, unten etwas dünner, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel lang, behaart,

Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, süß, ohne besonderes Aroma, Stein unablöslich stark gedrückt, oben obgerundet, unten etwas verlängert stumpfspitz, Rücken und Bauch nicht bedeutend verschieden, Breite ziemlich in der Mitte, etwas afterkantig. Baum stark, tragbar. L. II. H. S. 93.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

370. Biondeck's rothe Frühzwetsche. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, hellroth, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr edel, Stein löslich, oval, afterkantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. S. 61.

323. Meierböck's rothe Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch goldgelb, sehr saftig, zuckersüß erhaben, Stein löslich, eiförmig, afterkantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 62.

35. Rothe Renklode. E. Aug. I. Rang.

Groß, lichtroth, oval, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelb, süß-erhaben, Stein fast löslich, oval, Baum stark, tragbar. B. n. Obstf. S. 134.

47. Rothe Zwetsche. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Prunus oxycarpa Bechst.

Mittelgroß, braunroth, umgekehrt eiförmig, unten ziemlich spitz, Breite etwas nach oben, Rücken und Bauch ziemlich gleich, Stiel ziemlich lang, behaart, Fleisch gelb, trocken, süß-säuerlich, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten zackig spitzig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum sehr groß, äußerst tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 96.

81. Burgunder-Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, röthlich-schwarz, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten spitz, Rücken und Bauch fast gleich hoch, die Breite

stark nach oben, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich, härtlich, saftig, recht angenehm zuckersüß, Stein nicht ganz löslich, einseitig lanzettförmig, oben kurz scharfspitzig, unten lang stumpfspitz, Rücken mehr erhoben, Breite nach oben. Baum groß, ziemlich tragbar, frühe große Blüthen. Aus Monza. L. II. H. S. 98.

294. Sharp's Emperor. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas verjüngt, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch goldgelb, saftig, schmelzend, sehr edel, zuckersüß erhaben, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, afterkantig. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. J. 1845. S. 269.

408. Rodt's frühe große Pflaumenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, auch sehr groß. Zwetschenförmig-oval, oben mehr spitz, dunkelroth, kleine gelbe Punkte. Stiel einen Zoll lang, dünn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, grünlich, sehr saftig, süß, angenehm erhaben. Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 14.

408½ Maroko-Pflaume.

In allem ähnlich der vorstehenden Frucht. B. u. Obstf. S. 15.

262. Radlkofer's rothe Frühzwetsche. ⅔ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelblich roth, kleine, graue Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, gröblich, sehr saftig, süß, angenehm erhaben, Stein ablöslich, lanzettförmig, oben und unten spitz, etwas afterkantig, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 15.

341. Lallinger's Königspflaume. ⅔ Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, unbeständig, meistens eiförmig, rothbraun, mehr dunkelviolett, oft fast schwarz, röthlich gelbe Punkte, Stiel zehn Linien lang, dick, meistens gerade, rostig, stark behaart, Fleisch weißgelb, glänzend, härtlich, überfließend, zuckersüß, recht lieblich erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, oben rund, unten stumpfspitz, afterkantig. B. u. Obstf. III. H. S. 16.

205. Königin Victoria. Nr. 2. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, oval, braunroth mit weißgrauen Punkten, Stiel behaart, einen Zoll lang, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, überaus süß, erhaben aromatisch, Stein gut ablöslich, einseitig oval, unten mehr spitz, als oben, afterkantig, Baum sehr tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 17.

224. Isabella. Anf. Sept. II. Rang.

Groß, rothblau, zylinderartig, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch fast gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, stark behaart, Fleisch gelblich-weiß, glänzend, härtlich, etwas gröblich, nicht allzu saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, oval-umgekehrt eiförmig, Breite in der Mitte, oben und unten spitz, afterkantig. Baum tragbar, kräftig. Blüthen frühe, groß. L. II. H. S. 190.

181. Violette Kaiserpflaume mit bunten Blättern. II. Rang.

Groß, ungestaltet oval, rothblau, Stiel kurz, behaart. Der Baum hat weißgelbgefleckte Blätter, mangelhafte Blüthen, die selten Frucht ansetzen. L. II. H. S. 103.

56. Violette Kaiserin. ½ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, oben und unten spitzig, violettblau, Stiel mittellang, behaart, Fleisch goldgelb, fest, fein, sehr saftreich, sehr edel zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig eiförmig, afterkantig. Baum groß, reichlich tragbar. L. II. H. S. 104.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

41. Katalonischer Spilling. Juli, Aug. II. Rang.

Klein, kurz umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, weich, saftig, ziemlich angenehm süß, Stein ablöslich, oval, oben kurz scharfspitzig, unten stumpfspitz, afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich, daher selten voll, frühe große Blüthen. L. II. H. S. 106.

65. Gemeiner gelber Spilling. 1/3 Aug. III. Rang.

Prunus lutea Bechst.

Klein, gelb, länglich-oval, oben und unten spitzig, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, etwas fest, saftig, süß, ohne Erhabenheit, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig. Baum sehr groß, fruchtbar. L. II. H. S. 109.

172. Doppelter Spilling. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, walzenförmig-oval, grünlich-gelb, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, fest, saftig, angenehm süßweinig, Stein unablöslich, lanzettförmig-oval, oben scharf-, unten stumpfspitz, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Eine Art. L. II. S. 111.

315. Burhardt's gelbe Frühzwetsche. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, gelb, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelb, süßerhaben, Stein klein, löslich, lanzettförmig, Baum mittelgroß, fruchtbar. B. u. Obstf. S. 66.

163. Gisborne's Zwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig oval, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, süß, Stein löslich, afterkantig, Baum fruchtbar. B. u. Obstf. I. H. S. 68.

351. Kook's neue Diaprée. 2/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, Stiel mittellang, behaart, Fleisch zart, strahlig, Stein löslich, einseitig, oval, afterkantig. B. u. Obstf. I. H. S. 67.

10. Gelbe Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, grünlich-gelb, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch gelb, saftig, zart, schmelzend, angenehm feinweinsäuerlich-süß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitzig, stark gedrückt. Baum sehr groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1845. S. 284.

398. Bernstein Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Gut, mittelgroß, gedrückt oval, hellgelb, Stiel lang, kahl,

hellgrün, Stein unablöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig. Baum groß, fruchtbar. B. u. Obstf. I. H. S. 70.

394. Graf Gustav von Egger. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Groß, gut eiförmig, hellgelb, Stiel lang, haarig, dick, Fleisch weißgelb, löslich, saftig, sehr edel, Stein oval, afterkantig, Baum gemäßigt. B. u. Obstf. I. H. S. 71.

329. Wahre prachtvolle Hulling. $^1/_2$ Sept. I. Rang.

Sehr groß, oval, grünlichgelb, Fleisch sehr edel, süß, Stein ablöslich, Baum charakteristisch große, dicke, zurückgebogene, ovale Blätter, jedoch mäßig tragend. Monatschr. 1856. S. 410.

43. Reizensteiner gelbe Zwetsche. E. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, an ver Sonnenseite hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, zart, etwas durchsichtig, saftig, sehr süß, eigenthümlich aromatisch, Stein unablöslich, lanzettförmig oval. Baum groß, reichlich tragbar. L. I. H. S. 112.

384. Bleeker's gelbe Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Groß, gelb oval, röthliche, weißliche Punkte, Stiel zwölf Linien lang, dünn, kurz behaart, rosenroth angelaufen, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig, nicht sehr saftig, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum dauerhaft fruchtbar. Fr. Bl. 1852. S. 292.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

392. Georgswalder Diaprée. E. Aug. II. Rang.

Eine gelblich-grüne Zwetsche mit unablöslichem Stein.

342. Bingham's Pflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, verschoben-oval, grünlichgelb, schwache, weißliche Punkte, zahlreich rothe Punkte und rothe Flecken fast überall, Stiel elf Linien lang, kaum merklich behaart, dick, Fleisch grünlich-gelb, gröblich, saftig, faserig, weich, glänzend, zuckersüß, aromatisch, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig, Baum stark und tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 19.

384. Bleeker's gelbe Renklode. E. Aug. II. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, wachsgelb, auch grünlich-gelb, röthliche und weißliche Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn, kurz behaart, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig und nicht sehr saftig, Stein ablöslich, oval, Backen rauh, afterkantig, Baum groß und der Fortpflanzung werth. B. u. Obstf. III. H. S. 18.

425. Oulen's Renklode. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Reine-Claude d'Oulens.

Frucht mehr als mittelgroß, gelb, renklodeförmig, rund-oval, oben und unten gedrückt, roth punktirt, Stiel lang, dünn, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, süß, sehr edel, aromatisch, Stein unablöslich, afterkantig, Baum kräftig, tragbar. Eine sehr schöne, liebliche Pflaume, aller Aufmerksamkeit werth. Monatschr. 1861.

Den Baum erhalten von Ad. Papelen zu Weteren in Belgien.

217. Traubenpflaume. A. Sept. III. Rang.

Sehr klein, oval, grün, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, fein weinsäuerlich, Stein unablöslich einseitig oval, oben und unten spitz, etwas afterkantig. Baum gemäßigt, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 115.

23. Grüne gestreifte Zwetsche. $^1/_2$ Sept. II. Rang.

Mittelgroß, dickbauchig, umgekehrt eiförmig, unten spitzig, gelblich-grün, rothgefleckt, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, angenehm-süß, Stein unablöslich, oval, oben abgerundet, kurz, scharfspitz, unten stumpfspitz. Baum klein, nicht tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 204.

92. Grüne Dattelzwetsche. $^1/_2$ Sept. II. Rang.

Ziemlich groß, ungestaltet länglich-umgekehrt eiförmig, gelblich-grün, bisweilen etwas röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleisch gelblich-weiß, etwas fest, sehr saftig, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig lanzettförmig, oben scharf- und verlängert stumpfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. 116.

237. Zwetsche von Harvy. 2/3 Aug. II. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten stumpfspitz, weißlich grün, etwas röthlich, Stiel einen Zoll lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, zart, etwas teigig, saftig, zuckersüß, etwas gewürzt, Stein ablöslich, oben gerundet, unten langspitz, afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. 20.

307. Frühe grüne Zwetsche. Heupflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, zwetschenförmig, gelbgrün, oft ganz gelb, weißliche Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünne, behaart, röthlich angelaufen, Fleisch grünlichgelb, weich, überfließend, angenehm aromatisch, süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig spitzig, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 73.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

203. Marmorirte Eierpflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Kaum mittelgroß, fast oval, weißlich gelb, roth angelaufen, schön, gut, Stiel lang, dünn behaart, grün, Fleisch hellgelb, weich, weinartig, Stein gut ablöslich, breit lanzettförmig, Sommerzweige behaart. B. n. Obstf. I. H. S. 77.

38. Zweimal tragende Pflaume. 1/3 Sept. III. Rang.

Klein, oval, grünlich-gelb, bisweilen röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, mattsüß, Stein unablöslich, einseitig, lanzettförmig-oval. Baum klein, empfindlich für Kälte, selten voll. Trägt äußerst selten zweimal. L. II. H. S. 118.

209. Graugrüne Zwetsche. M. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, graugrün, röthlich angelaufen, eiförmig oval, oben und unten gleich gerundet, etwas dicker als breit, voll von weißlichen Punkten, Stiel lang, dünn, Fleisch grünlich gelb, saftig, zart, weich, überaus süß, recht gut, Stein fest am Fleische, oben scharfspitz, Rückenkanten stumpf, Baum groß und sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 76.

403. Lepine. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ziemlich rund, schwarzblau, ablösliches, gelbliches Fleisch, würzig, Baum der Vermehrung werth. Monatschr. 1856. S. 410.

303. Smith's Orleans-Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Groß, oval, dunkelviolett, fast schwarzblau, gelbliche Punkte, Stiel sechs Linien lang, kahl, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, zuckersüß, parfümirt, Stein gänzlich unablöslich, oval, etwas spitz, afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. 24.

283. Urbaneck's schwarze Damaszene. $^1/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, schwarzblau, goldfarbene Punkte zahlreich, Stiel zehn Linien lang, dünn behaart, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, angenehm süß, Stein gut ablöslich, verschoben, umgekehrt-eiförmig, oben gerundet, unten charakteristisch vorgeschoben. B. n. Obstf. I. H. S. 80.

II. Klasse.

Die Damaszenen.

Prunus damascena. Prunus insititia.

Mit runden Früchten, gepaarten, selten einzelnen Blüthenstielen, gedrücktem, oben und unten abgerundet stumpfspitzigem, bisweilen aber kurz zugespitztem Steine.

I. Ordnung.

Die zwetschenartigen Damaszenen.

Prunus domestico-damascena.

Mit kahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils zartem, sprödem Holze, dicken, stark markigen Sommerzweigen des Baumes und zartem, sehr saftigem, äußerst süßem Fleische der Frucht. Die Vegetation des Baumes nähert sich jener der wahren Zwetsche.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

89. Schlehenpflaume. L. ½ Aug. III. Rang.

Prunus insititia. L.

Klein, eiförmig-rund, schwarzblau, Stiel kahl, mittellang, Fleisch grünlich, härtlich, saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, oval, afterkantig. Baum mittelgroß, strotzend tragbar, frühe, kleine Blüthen. Fr. Bl. J. 1844. S. 213.

159. Lange violette Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, verschoben, kurz eiförmig-oval, violettbraun, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelbgrün, faserig, härtlich, saftig, sehr angenehm süß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben kurz scharfspitz, unten verlängert stumpfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, mittelmäßig fruchtbar. L. II. H. S. 122.

77. Die Brugnoller Pflaume von Tours. E. Aug. III. Rang.

Klein, oval, nach unten etwas verjüngt, dunkelblau, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, zart, weich, saftig, fein weinsäuerlich-süß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitz, etwas afterkantig. Baum klein, Blüthen frühe. L. II. H. S. 135.

248. Blaue Krieche mit halbgefüllter Blüthe. ½ Sept. III. Rang.

Klein, rund-oval, dunkelblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch grünlich, angenehm süß, Stein unablöslich, oben gerundet, unten stumpfspitz. Baum mittelgroß, tragbar. Ohne Werth. L. II. H. S. 127.

322. Kirke's Pflaume. ⅕ Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig-rund, dunkelviolett, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, schmelzend, saftreich, erhaben aromatisch zuckersüß, Stein ablöslich, klein, gedrückt oval, oben rund, unten spitz. Baum kräftig, scheint fruchtbar zu sein. Ist zu empfehlen. Fr. Bl. J. 1844. S. 214.

299. Blaue Weinpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Klein, ovalrund, schwarzblau, Stiel lang, Fleisch gelblich, mäßig saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, ovalrund, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Eine gute Sorte der sogenannten Kriechen. Fr. Bl. J. 1844. S. 351.

410. Hauffer's Königspflaume. M. Sept. I. Rang.

Groß, ovalrund, dunkelviolett, fast schwarzblau, gelbe Punkte, Stiel einen Zoll lang, dünn und behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, zwetschenartig, süß, weinsäuerlich, angenehm, Stein ablöslich, oben abgerundet, Baum allgemein zu empfehlen. B. n. Obstf. III. H. S. 23.

175. Hauptmann Kirchhof's Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Klein, rundlich, dunkelviolett, zahlreiche, goldfarbene Punkte, gut, Stiel mittellang, kahl, Fleisch zart, zuckersüß, saftig, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum klein, strotzend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 81.

140. Dunkelblaue Eierpflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Sehr groß, oval, auffallend dicker als breit, dunkelblau, oft röthliche Punkte, schön, Stiel sehr lang, dünn, schwach behaart, Fleisch blaßgelb, härtlich, kaum merklich säuerlich, Stein unlöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig, Baum groß, selten volltragend. B. n. Obstf. I. H. S. 18 und III. H. S. 58.

306. Herbstpflaume. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, plattrund, nach unten etwas verjüngt, schwarzblau, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, zart, sehr saftig, erhaben süß, Stein ablöslich, oval-rund, afterkantig. Baum gemäßigt, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 230.

182. Meerstrandspflaume. Okt. III. Rang.

Prunus maritima. DC.

Sehr klein, schwarzblau, etwas plattgedrückt-rund, Stiel kahl, mittellang, Fleisch grünlich, säuerlich, matt, Stein unablöslich,

oval. Strauch mittelgroß, nicht tragbar. Eine Art aus Nordamerika. Fr. Bl. J. 1844. S. 230.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

103. Rothe Nektarine. M. Aug. I. Rang.

Groß plattgedrückt-rund, rothbraun, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, brüchig, sehr saftig, süß-weinig-erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, nach unten verjüngt, etwas afterkantig. Baum groß, nicht tragbar. Lachend schöne, recht gute Frucht. L. II. H. S. 128.

314. Behren's Königspflaume. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Groß, gedrückt rundlich, violettblau, fast schwarzblau, goldfarbene Punkte, schön, Stiel mittellang, dünn, kahl, Fleisch gelb, zart, aromatisch, sehr saftig, Stein ablöslich, oval, sehr empfehlenswerth. B. n. Obstf. I. H. S. 90.

253. Gustav Berlet's Frühdamaszene. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, rothblau, gelbfarbene Punkte, auch Streifen, Stiel sehr lang, dünn, kahl, Fleisch gelblich weiß, angenehm, süß, Stein ablöslich, verschoben oval, Baum kräftig, strotzend tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 22.

74. Mayer's rothe Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, ziemlich rund, braunroth, Stiel dünn, schwach behaart, Fleisch hellgelb, fein säuerlich, sehr saftig, Stein löslich, groß, oval, bisweilen afterkantig, Baum groß, strotzend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 89.

1. Rothe Kirschpflaume. $^1/_2$ Aug. III. Rang.

Prunus cerasifera Ehrh.

Fast mittelgroß, plattgedrückt-rund, kirschroth, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas durchsichtig, sehr weich, saftig, mattsüß, Stein unablöslich, oval. Baum mittelgroß, selten reichlich tragbar. Eine Art aus Nordamerika. L. II. H. S. 130. B. n. Obstf. III. H. S. 156.

19. Rothe Mirabelle. ½ Aug. II. Rang.

Sehr klein, eiförmig-rund, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch weißlich-gelb, schmelzend, saftreich, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, oval, oben stumpfspitz, unten abgestutzt. Baum klein, für Kälte empfindlich, daher nicht sehr fruchtbar. Sehr kleine Blüthen, kleine Zweige und Blätter. L. II. H. S. 133.

252. Trauttenberg's Zuckersüße. ½ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, gedrückt rund, oben platt, unten etwas verjüngt, dunkelbraun, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelb, sehr saftig, sehr edel, Stein unablöslich, Baum fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 40.

411. Walther's Pflaume. ½ Aug. I. Rang.

Groß, rund, violett, Fleisch gut ablöslich, gelb, zart, köstlich, zuckersüß aromatisch. Monatschr. 1858. S. 281.

211. Dochnahl's Damaszene. ⅔ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, braunroth, goldfarbene Punkte, Stiel lang, dick, schwach behaart, Fleisch weißgelb, äußerst saftig, edel, Stein ablöslich, verschoben oval, afterkantig, Baum stark und tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 92.

28. Schiebler's rothe Damaszene. ⅔ Aug. I. Rang.

Groß, ovalrund, roth, edel, Stein ablöslich, Farbe ähnlich der rothen Eierpflaume. Monatschr. 1856. S. 409.

301. Prinzen's rothe Renklode. ⅔ Aug. I. Rang.

Nicht mittelgroß, oval, braunroth, goldfarbene Punkte, Stiel dünn, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, süß, sehr gut, Stein ablösbar, lanzettförmig, scharfe Afterkanten, Baum kräftig, dicht belaubt. B. n. Obstf. III. H. S. 28.

266. Trummer's violette Damaszene. ⅔ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, etwas plattgedrückt rund, rothbraun, an der Sonnenseite dunkelviolett, Stiel lang, dünn, fein behaart, rostfarbig, Fleisch weißgelblich, überfließend saftig, süß, Stein ablös-

lich, verschoben eiförmig, Baum dicht belaubt und fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 27. Syst. Anl. II. H. S. 266.

449. Firbas's Königspflaume. 3/3 Aug. I. Rang.

Groß, oval-rund, rothblau, Fleisch gut ablöslich, gelb, saftig, härtlich, sehr süß aromatisch. Monatschr. 1858. S. 282.

236. Kölnische Pflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, verschoben rundlich, braunroth, Stiel dünn, kahl, Fleisch weißgelblich, weich, saftig, süß, gut, Stein ablösbar, oval, afterkantig, Baum lebhaft treibend, mäßig tragbar. Die Frucht ist gut, gehört jedoch nicht in den allerersten Rang. B. n. Obstf. III. H. S. 26. Monatschr. 1855. S. 283.

251. Liegel's Zwillingspflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, gedrückt, hellroth, zahlreiche graue Punkte, Stiel dünn, haarig, Fleisch weiß-gelblich, strahlig, saftig, süß parfümirt, Stein gut ablöslich, oval, Baum mittelmäßig, strotzend tragbar. B. n. Obstf. S. 26.

125. Friedheim's rothe Damaszene. E. Juli. I. Rang.

Klein, rundlich, oben und unten plattgedrückt, hellroth, kleine goldfarbene Punkte, Stiel fünf Linien lang, behaart, Fleisch goldgelb, glänzend, fest, saftig, zuckersüß, recht angenehm, Stein hohl im Fleische, oval, Baum mittelgroß und tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 87.

296. Prinzen's Kaiser-Reineclaude. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, kurz oval, hellgrün, süß erhaben, aromatisch, Stein unablöslich. Monatschr. 1856. S. 410.

87. Freudenberger-Pflaume. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz oval, dunkelviolett, Fleisch weich, süß, etwas gewürzt, ablöslich. Monatschr. 1858. S. 281.

188. Cruger's Frühpflaume. E. Aug. I. Rang.

Cruger's Scarlet.

Frucht mehr als mittelgroß, oval, hellroth, mit kleinen gelben Punkten, Stiel mittellang, haarig, röthlich, Fleisch gelb, saftig,

gewürzt-süß, Stein umgekehrt eiförmig, groß, ablöslich, afterkantig, Baum groß, fruchtbar. Die Frucht hat eine schöne, lieblich hellrothe Farbe. Monatschr. 1861.

Den Baum von Ad. Pepelen aus Belgien.

319. Robe de Sergent.

Eine mittelgroße, plattrunde, rothe Pflaume von sehr gutem Geschmack. Fr. Bl. J. 1844. S. 349.

158. Runde rothe Damaszene. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, violett, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, etwas trocken, brüchig, zart, angenehm süß, Stein ablöslich, oval, nach unten verjüngt, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. 135.

184. Ballonartige rothe Damaszene. E. Aug. II. Rang.

Klein, violett, rundlich, oben gedrückt, unten verjüngt, Stiel behaart, mittellang, Fleisch goldgelb, sehr saftig, zart, angenehm süß, Stein unablöslich, umgekehrt eiförmig-rund. Baum mittelgroß, kleine frühe Blüthe. L. II. H. S. 137.

7. Damaszene von Maugerou. E. Aug. I. Rang.

Groß, plattgedrückt-rund, nach unten etwas verjüngt, blaulich-roth, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, nicht sehr saftig, brüchig, sehr angenehm erhaben-süß, Stein ablöslich, oval, oben abgerundet, unten etwas verjüngt, Backen stark erhoben, charakteristisch stark afterkantig. Baum groß, mäßig fruchtbar. Kronenblätter groß, schöne, große, gute Frucht. L. II. H. S. 139.

241. Nickitaer frühe Königspflaume. Anf. Sept. I. Rang.

Kurz-oval, am Stiele verjüngt, rothbraun, mittelgroß, Stiel kahl, lang, Fleisch goldgelb, fast pomeranzengelb, weich, schmelzend, saftig, aromatisch-süß, Stein kurz lanzettförmig-oval, unten vorgeschoben-spitz, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, kleine frühe Blüthe. Sehr edle Frucht, zerspringt aber im Regen gerne. L. II. H. S. 142.

183. Galissonière. A. Sept. III. Rang.

Klein, kurz oval, kirschroth, Stiel kahl, lang, Fleisch hoch goldgelb, weich, sehr saftig, süß-weinsäuerlich, matt, Stein unablöslich, verschoben oval, Backen stark gedrückt. Strauch mittelgroß, dornig. Aus Nordamerika. Nach botanischen Merkmalen eine Kirsche, die Früchte sind aber pflaumenartig. Fr. Bl. J. 1844. S. 253.

115. Trauttenberg's rothe Aprikosenpflaume. A. Sept. I. Rang.

Oval, unten etwas kleiner, mittelgroß, roth, Stiel lang, fast kahl, Fleisch weißlich, strahlig, glänzend, härtlich, sehr saftig, ungemein süß, lieblich erhaben, Stein ablöslich, oval. Baum mittelgroß, tragbar. Die Frucht delikat, zerspringt aber im Regen gerne. B. u. Obstf. III. H. S. 95.

14. Rother Perdrigon. M. Sept. I. Rang.

Klein, fast rund, gegen unten kaum merklich verjüngt, rothblau, Stiel kurz behaart, lang, Fleisch gelb, überfließend vom Saft, etwas härtlich, zart, schmelzend erhaben aromatisch zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben stark abgerundet, unten etwas vorgeschoben spitz, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. Eine zwar kleine, aber sehr gute Frucht. L. II. H. S. 144.

374. Haffner's Königspflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, rundoval, violettblau, einzelne goldfarbene Punkte, Stiel dick, fünf Linien lang, etwas behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, sehr angenehm, Stein ablöslich, oben rund, unten stumpfspitz, Backen afterkantig, Baum kräftig und sehr tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 25.

49. Violette Renklode. M. Sept. I. Rang.

Plattgedrückt-rund, röthlichblau, an der Sonne fast dunkelblau, mittelgroß, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftig, recht angenehm erhaben süß, Stein unablöslich, verschoben oval, oben spitz, unten abgestutzt, etwas afterkantig. Baum groß, empfindlich, nicht tragbar. Eine gute Frucht. L. II. H. S. 146.

345. Zahlbruckner's violette Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Gut, mittelgroß, rund, violettblau, fast schwarzblau, goldfarbene Punkte, Stiel dünn, sieben Linien lang, kurz behaart, Fleisch weißgelb, zart, fein, saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein gut ablöslich, kurz oval, Mittelkante erhoben, Baum groß und tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 91.

109. Große Roßpaucke. $^2/_3$ Sept. II. Rang.

Prunus depressa. Liegel.

Groß, eiförmig-rund, die Backen stark gedrückt, braunroth, Stiel lang, beharrt, Fleisch weißgelb, grobfaserig, saftig, brüchig, bisweilen mehlig, angenehm süß, Stein ablöslich, verschoben oval, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 148.

86. Schamal's Herbstpflaume. E. Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, roth, Stiel lang, kahl, Fleisch weißgelb, strahlig, zart, schmelzend, angenehm, süß-feinweinsäuerlich, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet stumpfspitz, unten verlängert spitz. Baum groß, sehr fruchtbar. Fr. Bl. J. 1846. S. 220.

61. Schweizer-Pflaume. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, nach unten verjüngt, rothbraun, Stiel lang, schwach behaart, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, saftig, angenehm aromatisch-süß, Stein unablöslich, oval, umgekehrt eiförmig, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich für Frost, nicht reichlich tragbar. L. II. H. S. 150.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

239. Gelbe Kirschpflaume. $^1/_2$ Aug. III. Rang.

Unterscheidet sich von der rothen Kirschpflaume durch ihre gelbe, nur an der Sonnenseite roth angelaufene Farbe, übrigens sind Frucht und Baum gleich. B. u. Obstf. III. H. S. 98.

375. Pflaume von St. Etienne. $^1/_2$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, grünlich-gelb, roth punktirt-gefleckt, Stiel mittellang, kahl, Fleisch gelb, glänzend, strahlig, zart, schmel-

zend, köstlich erhaben-süß, Stein oval, gut ablöslich, afterkantig. Baum mittelgroß, scheint tragbar zu sein. Vorzügliche Frucht. Fr. Bl. J. 1845. S. 269.

52. Frühe gelbe Renklode. ½ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, grüngelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, weich, sehr saftig, sehr lieblich zuckersüß, Stein ablöslich, verschoben oval, nach unten etwas verjüngt, afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich für Kälte, tragbar, späte Blüthe. L. II. H. S. 155.

161. Aprikosenartige Mirabelle. ⅔ Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, oval, gelb, voll rother Punkte, Stiel sieben Linien lang, etwas behaart, Fleisch gelb, härtlich, saftig, eigenthümlich aromatisch, Stein nicht gut löslich, oval, afterkantig, Baum klein. B. u. Obstf. I. H. S. 100.

292. Prinzen's gelbe Renklode. ½ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz oval-rund, grünlich-gelb, auch wachsgelb, grüne und rothe Flecken, Stiel acht Linien lang, kahl, Fleisch gelb, zart, saftig, süß, Stein vollkommen ablöslich, oval, Backen afterkantig. B. u. Obstf. III. H. S. 29.

397. Katharinenpflaume mit bunten Blättern. Okt. I. Rang.

Die Frucht in der Größe, Gestalt, Farbe, im Geschmacke und der Zeitigung der gelben Katharinenpflaume Nr. 48, II. Heft, S. 182 ganz gleich, Baum groß und mäßig tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 109.

297. Rangheri's frühe, gelbe Mirabelle. ⅔ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, ganz regulär, hellgelb, roth punktirt und gefleckt, malerisch schön, Stiel sieben Linien lang, dünn, behaart, Fleisch gelb, überfließend, zart, schmelzend, etwas härtlich, sehr zuckerreich, edel parfümirt, Stein lösbar, afterkantig, Baum groß, fast jährlich strotzend fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 31.

285. Monroë. ⅓ Sept. I. Rang.

Klein, ovalrund, oben und unten stumpfspitz, gelb, zahlreich rothe Punkte, einzelne rothe Flecken, Stiel dünn, kahl, sieben

Linien lang, Fleisch gelb, überfließend, etwas fest, zuckersüß, delikat, aromatisch, Stein unablöslich, lanzettförmig, oben scharf, unten stumpfspitz, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. u. Obstf. III. H. S. 30.

209. Ark's doppelte Mirabelle. 1/3 Sept. I. Rang.

Klein, kurz oval, grünlichgelb, stark rothpunktirt, Stiel einen halben Zoll lang, behaart, dick, Fleisch grünlich gelb, saftig, härtlich, sehr süß, edel, Stein hohl im Fleische, eiförmig, oben und unten spitz, afterkantig. B. u. Obstf. I. H. S. 146.

168. Prunus Cocomilia Tenor. 1/2 Sept. III. Rang.

Eine Art. Mittelgroß, gelb, rund, viele rothe Punkte, Stiel zwei Linien, kahl, dünn, Fleisch gelb, weich, bitterlich sauer, Stein ablöslich, eiförmig, Strauch ähnlich dem Schlehenstrauche, Vaterland Calabrien. Fr. Bl. 1849. S. 75.

139. Ottomanische Kaiserpflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, etwas walzenförmig, grünlich-gelb, Stiel lang, schwach behaart, Fleisch gelb, durchsichtig, glänzend, weich, schmelzend, sehr saftig, angenehm süß, Stein einseitig oval, oben und unten spitz. Baum groß, tragbar, frühe große Blüthen. L. II. H. S. 157.

82. Große weiße Damaszene. E. Aug. II. Rang.

Groß, oft sehr groß, kurz eiförmig-oval, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, fest, überfließend vom Saft, erhaben süßweinsäuerlich, Stein unablöslich, verschoben, eiförmig-oval, oben einseitig scharfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, strotzend tragbar, frühe Blüthe. L. II. H. S. 160.

361. Dühamel's große weiße Damaszene. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, unten etwas verjüngt, grünlich-gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlich-gelb, saftig, fein säuerlich-süß, Stein unablöslich, verschoben oval, afterkantig. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 267.

20. Gelbe Aprikosenpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oft auch groß, verschoben rundlich-oval, aprikosenartig röthlich-gelb, mit rothen Punkten und Flecken, Stiel behaart, lang, Fleisch dunkelgelb, weich, saftig, überaus angenehm erhaben süß. Baum mittelgroß, strotzend tragbar. Schön und gut. L. II. H. S. 162.

126. Hlubek's Aprikosenpflaume. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Groß, scheinbar länglich, oben so hoch als breit, grünlichgelb, zuletzt wachsgelb, viele kleine weiße Punkte, Stiel lang, mitteldick, kurzhaarig, rostig, Fleisch weißgelb, härtlich, strahlig, saftig, fein weinsäuerlich, Stein ablöslich, oval, schwach afterkantig, Baum groß und tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 101.

72. Dörrell's neue Aprikosenpflaume. E. Aug. II. Rang.

Eine Varietät der gelben Aprikosenpflaume, ist aber um die Hälfte kleiner. Baum klein, tragbar.

421. Esperen's Goldpflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, gelb, oval, Fleisch unablöslich, gelb, härtlich, äußerst zuckersüß, erhaben, Baum tragbar. Monatschr. 1858. S. 282.

448. Royer's Aprikosenpflaume. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Groß, rundlich, grünlichgelb, rothpunktirt-gefleckt, Stiel acht Linien lang, dünn, unbehaart, Fleisch grünlichgelb, zart, sehr saftig, delikat, Stein löslich, oben abgerundet, unten stumpfspitz, afterkantig. Monatschr. 1858. S. 282.

26. Weißer Perdrigon. E. Aug. I. Rang.

Ovalrund, unten etwas verjüngt, klein, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, härtlich, schmelzend, aromatisch-süß, Stein ablöslich, oval, unten verjüngt. Baum mittelgroß, nicht tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 260.

134. Weiße Kaiserpflaume. $^1/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, wachsgelb, viele rothe Punkte, Stiel acht Linien lang, dick, kahl, Fleisch gelb, saftig, zart, süß, aromatisch, Stein unablöslich, einseitig oval, Backen etwas afterkantig. B. u. Obstf. S. 32.

22. Weiße Jungferpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, nach unten etwas abnehmend, weißgelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, durchsichtig, weich, saftig, recht angenehm süß, Stein unablöslich, rundlich, oben und unten spitz, Baum mittelgroß, tragbar, späte, kleine Blüthe. L. II. H. S. 165.

101. Braunauer aprikosenartige Pflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, rundlich, kurz oval, an den Backen etwas gedrückt, wachsgelb, auch grünlich-gelb, Stiel oft sehr lang; kahl, Fleisch gelb, fest, überfließend vom Saft, recht angenehm, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, afterkantig. Baum sehr groß, trägt strotzend. Eine ausgezeichnet gute Frucht. L. II. H. S. 167.

254. Gelbe Renklode mit halbgefüllter Blüthe. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmig-rund, grün gelb, Stiel sehr kurz, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, zart, sehr saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, eiförmig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. 170.

83. Kleine weiße Damaszene. A. Sept. II. Rang.

Sehr klein, oval-rund, weißgelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, fest, saftig, fein, angenehm süß, Stein unablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, nicht empfindlich, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 267.

242. Ballonartige gelbe Damaszene. 1/3 Sept. II. Rang.

Sehr klein, rund, nach unten verjüngt, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, zart, schmelzend, saftig, recht angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig umgekehrt-eiförmig, oben rund, unten spitzig. Baum klein, mäßig tragbar, kleine Blüthe. L. II. H. S. 172.

168. Prunus Cocomilia. 1/2 Sept. III. Rang.

Fast mittelgroß, rundlich, wachsgelb, viele rothe Punkte und Flecken, Stiel sehr kurz, kahl, dünn, Fleisch gelb, weich, bitterlich

säuer, Stein ablöslich, eiförmig, Mittelkante scharf. B. u. Obstf. I. H. S. 108.

232. Geperlte Mirabelle. 1/3 Sept. I. Rang.

Klein, ziemlich rund, grünlichgelb, aber dicht mit rothen Punkten geziert, Stiel lang, dick, kahl, Fleisch hellgelb, saftig, härtlich, sehr süß, Stein löslich, rundlich oval, afterkantig. Sehr ähnlich der doppelten Mirabelle (Goldpflaume). B. u. Obstf. I. H. S. 107.

24. Aprikosenartige Pflaume. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, nach oben abnehmend, Stiel kurz, kahl, Fleisch gelb, zart, überfließend vom Saft, sehr erhaben süß, Stein unablöslich, eiförmig. Baum sehr groß, tragbar. Gehört nach der großen grünen Renklode zu den besten Früchten. L. II. H. S. 175.

42. Weiße Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Klein, rundlich oval, nach unten etwas verjüngt, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, härtlich, sehr saftig, sehr erhaben süß, Stein ablöslich, einseitig oval, afterkantig. Baum klein, tragbar, kleine späte Blüthe. Köstliche Frucht. L. II. H. S. 178.

44. Weiße Kaiserin. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, weißgelb, oval-rund, unten nur etwas verjüngt, Stiel kurz, kahl, Fleisch weißgelb, fest, sehr saftig, sehr angenehm erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben oval, oben und unten spitz, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Gute Frucht. L. II. H. S. 180.

404. Merold's gelbe Renklode. 3/3 Sept. I. Rang.

Eine mittelgroße, gelbe, etwas ovale, delikate Damaszene. B. u. Obstf. III. H. S. 33.

48. Gelbe Kathrinenpflaume. E. Sept. I. Rang.

Klein, umgekehrt kurzeiförmig, oben platt, unten stark verjüngt, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, härtlich, sehr saftig, sehr erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, umgekehrt eiförmig,

oben abgerundet, unten spitz, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Köstliche Frucht. L. II. H. S. 182.

105. Downton's Kaiserin. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, oval, nach unten nur etwas verjüngt, gelb, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch gelb, glänzend, strahlig, saftig, schmelzend, sehr erhaben süß, Stein unablöslich, oval, oben rund, unten spitz, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. Delikate Frucht. L. II. H. S. 185.

278. Koch's gelbe Spätdamaszene. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, oben platt, unten einseitig verjüngt, grünlich-gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, strahlig, zart, schmelzend, saftig, sehr erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, oval, oben mehr abgerundet, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. Eine sehr edle Frucht. B. u. Obstf. III. H. S. 110.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

106. Graugrüne Frühpflaume. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Nicht mittelgroß, eiförmig rund, gelblichgrün, kleine weiße Punkte, Stiel dünn, lang, fast kahl, Fleisch weißgelb, härtlich saftig, süß, kaum merklich weinsäuerlich, Stein ablöslich, lanzettförmig, Rücken charakteristisch flachgedrückt, Baum kräftig, strotzend tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 113.

165. Grüne Weinpflaume. E. Aug. III. Rang.

Prunus vinaria Bechst.

Klein, ovalrund, gelblich-grün, Stiel lang, kahl, Fleisch weich, grünlich-gelb, sehr saftig, angenehm säuerlich-süß, Stein unablöslich, verschoben oval, unten abgerundet, oben spitzig. Baum sehr groß, fruchtbar. Eine Art. L. II. H. S. 187.

153. Durchsichtige. E. Aug. I. Rang.

Fast groß, kurz oval, gelblich-grün, Stiel behaart, lang, Fleisch gelb, härtlich, saftig, sehr fein, etwas durchsichtig, äußerst angenehm honigsüß, Stein fast ablöslich, verschoben oval. Baum groß, nicht sehr tragbar. L. II. H. S. 189.

281. Admiral Rigny. E. Aug. I. Rang.

Fast groß, oval, nach oben kaum merklich verjüngt, gelblich-grün, Fleisch grünlich-gelb, sehr saftig, zart, schmelzend, fein aromatisch, muskatellerartig zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben oval, etwas afterkantig, Baum kräftig, fruchtbar, frühe große Blüthen. Ausgezeichnete Frucht. L. II. H. S. 191.

30. Kleine grüne Renklode. E. Aug. I. Rang.

Klein, plattgedrückt-rund, gelblich-grün, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, fein, saftig, recht angenehm aromatisch süß, Stein unablöslich, oval, Baum groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 254.

4. Große grüne Renklode. A. Sept. I. Rang.

Prunus Claudiana. Liegel.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, gelblich-grün, Stiel kurz, etwas behaart, Fleisch grünlich-gelb, strahlig, durchsichtig, etwas härtlich, äußerst zart, schmelzend, vom reinsten, edelsten, aromatischen Zuckersaft, Stein fast ablöslich, verschoben kurz oval, etwas afterkantig. Baum kräftig, bisweilen strotzend tragbar. Die beste aller Pflaumen. Eine Art. L. II. H. S. 193.

325. Berlepsch's große, grüne Renklode. I. Rang.

Die große, grüne Renklode, die sich durch den Stein echt fortgepflanzt, wurde von den Botanikern als eine Art angenommen. Obgleich sogleich erkenntlich, variiren diese Samenfrüchte etwas in der Farbe, Größe, Form und im Geschmack. Unter diesen zeichnete sich eine Sorte durch zwanzig Jahre an Größe und Güte aus, und erhielt deßhalb von mir den Namen Berlepsch's große, grüne Renklode. B. n. Obstf. I. H. S. 115.

221. Frühe Renklode. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ziemlich rund, gelblich grün, zahlreiche rothe Punkte, Streifen und Flecken, Stiel sieben Linien lang, kaum merklich behaart, Fleisch weißgelb, glänzend, saftig, etwas härtlich, zuckersüß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, einseitig oval, Baum dicht belaubt, sehr tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 49.

158. Neue weiße Königin. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, weißlichgrün, gelblich, weißlich röthliche Punkte, Rostflecken, Stiel sieben Linien lang, dick, kurz behaart, Fleisch gelblichgrün, überfließend, zart, überaus süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, afterkantig, Baum mäßig, sehr tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 148.

324. Gonné's grüne Renklode, 330. Renklode extra, 99. Van Mons's Renklode, 376. Reineclaude Gigne sind schöne Varietäten der großen grünen Renklode, der Vermehrung werth.

243. Renklode von Jodoigne. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rund, anfänglich grün, später matt rothbraun, grüne, gelbliche Punkte, Stiel acht Linien lang, dick, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, überfließend vom Safte, zart, von süßem, sehr edlem Geschmacke, Stein unablöslich, oval, unten etwas spitz, Backen afterkantig, Baum scheint tragbar zu sein. B. u. Obstf. III. H. S. 34.

99. Van Mons's grüne Renklode. I. Rang.

Mittelgroße, grüne, runde Damaszene, von der großen, grünen Renklode wesentlich nicht verschieden. B. u. Obstf. I. H. S. 157. und III. H. S. 34.

29. Bavay's Renklode. 1/2 Sept. I. Rang.

Fast groß, grünlich-gelb, eiförmig-rund. Ist der Admiral Rigny ähnlich. Ist eine besonders gute Renklode. Fr. Bl. J. 1845. S. 253.

95. Jaspisartige Pflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Klein, ovalrund, gelblich-grün, weich, fein, schmelzend, sehr saftig, angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig oval, unten etwas spitz, Baum klein, sehr tragbar, frühe Blüthen. L. II. H. S. 196.

167. Weißes Zeiberl. 1/2 Sept. III. Rang.

Sehr klein, plattrund, gelblich-grün, Stiel kahl, lang, Fleisch gelblich-grün, weich, saftig, angenehm weinsäuerlich-süß, Stein

unablöslich, oval, Baum groß, nicht empfindlich, tragbar. L. II. H. S. 198.

63. St. Clara. E. Sept. und Okt. I. Rang.

Mittelgroß, niedriger als die große Renklode, gelblich grün, zahlreiche weißliche und röthliche Punkte, Stiel lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, äußerst saftig und süß, Stein unablöslich, einseitig oval, afterkantig, Baum kräftig, tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 117. und III. H. S. 59.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

169. Pond's Sämmling. ½ Sept. I. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, hellroth, viele dunkle Stellen, graulichе Punkte, Stiel lang, dick, fast kahl, Fleisch gelb, weich, angenehm süß, ohne besonderes Aroma, Stein unablöslich, oval, Baum stark tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 33.

36. Bunter Perdrigon. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, grünlich-roth-blau, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-weiß, durchsichtig, glänzend, weich, überaus saftreich, schmelzend, angenehm erhaben süß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben und unten verjüngt, Baum mittelgroß, fast jährlich tragbar. Schöne, gute Frucht, bisweilen aber etwas matt. L. II. H. S. 200.

108. Rothe Aprikosenpflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, verschoben kurz oval, weißgelb-rothgefleckt, oft ganz roth, Stiel kahl, lang, Fleisch weißgelb, fast goldgelb, etwas härtlich, saftig, müskirt aromatisch, köstlich erhaben süß, Stein ablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Lachend schöne, äußerst gute Frucht. L. II. H. S. 202.

191. Bunte Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Fast klein, rundlich, nach unten kaum merklich verjüngt, gelblich-weiß, oft ganz, meistens stellenweise hellroth angelaufen, Stiel lang, kahl, Fleisch weiß-gelb, zart, saftig, erhaben süß, Stein ab-

löslich, kurz oval. Baum mittelgroß, nicht reichlich tragbar. Fr. Bl. J. 1847.

305. Jefferson. ½ Sept. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, kurz, oval, etwas grünlich-gelb, zuletzt dunkelgelb, roth gefleckt, Stiel lang, dünn, kahl, Fleisch gelb, saftig, süß, recht angenehm, Stein nicht gut löslich, einseitig umgekehrt eiförmig, afterkantig, der Baum stark, scheint fruchtbar zu sein. B. u. Obstf. III. H. S. 33. Monatschr. 1855. S. 33.

327. Bohn's gestreifte Mirabelle. ⅔ Sept. I. Rang.

Sehr klein, oval, unten etwas verjüngt, gelb, stark rothgestreift-gefleckt, Stiel kahl, mittellang, Fleisch weißgelb, etwas härtlich, saftig, sehr edel angenehm süß, Stein ablöslich, oval, oben gerundet, unten spitz, etwas afterkantig. Baum klein, zärtlich. Fr. Bl. J. 1844. S. 284.

91. Brisette. Okt. II. Rang.

Sehr klein, oval, nach unten etwas vorgeschoben, gelb, stark rothgefleckt, Stiel fast kahl, mittellang, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftreich, angenehm süß, bisweilen eine Spur einer Säure, Stein unablöslich, verschoben oval, oben abgerundet kurz spitz, unten stumpfspitz, etwas afterkantig. Baum klein, fruchtbar. L. II. H. S. 205.

II. Ordnung.

Die wahre Damaszene.

Prunus damascena vera.

Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

Mit meistentheils großen, dunkelgrünen, behaarten, grobaderigen, dicken, steifen Blättern.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

186. Belgische Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, rund, schwarzblau, Fleisch angenehm zart, Stein ablöslich. Monatschr. 1858. S. 7.

259. Dieffenbach's schwarze Damaszene. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, gedrückt oval, schwarzblau, zahlreiche, goldfarbene Punkte, Stiel acht Linien lang, mäßig dick, behaart, rostig, Fleisch weißgelb, zart, überfließend vom Safte, überaus süß, angenehm erhaben, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten vorgeschoben, stumpfspitz, Kanten stumpf und zackig, Baum gemäßigt, mittelmäßig tragbar. B. u. Obstf. I. H. S. 129.

405. Firbas's Gabelpflaume. E. Sept. I. Rang.

Klein, kurz oval, schwarzblau, recht gut. B. u. Obstf. III. H. S. 37.

15. Johannespflaume. E. Juli. I. Rang.

Klein, verschoben, kurz oval-eiförmig, nach oben etwas kleiner, schwarzblau, Stiel dicht behaart, mittellang, Fleisch gelblich-grün, sehr saftig, recht angenehm weinsäuerlich-süß, etwas parfümirt, Stein fast ablöslich, verschoben oval. Baum groß, sehr fruchtbar. Eine der frühesten, guten Pflaumen. L. II. H. S. 208.

416. Blaue Frühdamaszene. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, dunkelviolett, rund, Stein ablöslich, Fleisch süß aromatisch, frühe Zeitigung. Monatschr. 1856. S. 411.

311. River's Frühpflaume. A. Aug. I. Rang.

Klein, rund, schwarzblau, zuckersüß, sehr edel, ablöslich. Monatschr. 1858. S. 7.

354. Die Frühe-Schwarze. $^1/_3$ Aug. I. Rang.

Klein, plattgedrückt rund, schwarzblau, Stiel mittellang, kurz behaart, dick, braun, Fleisch grünlichgelb, härtlich, süß, Stein ablöslich, rundlich, Backen afterkantig, Baum gemäßigt und kleine, frühe Blüthen. Monatschr. 1855. S. 73. B. u. Obstf. III. H. S. 35.

39. Herrenpflaume. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, nach unten verjüngt, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich-grün, weich, saftig, angenehm süß, doch nicht besonders erhaben, Stein ablöslich, oval,

nach unten verjüngt, schwach afterkantig. Baum stark, nicht empfindlich für Kälte, sehr frühe, große Blüthen. L. II. H. S. 213.

34. Große Damaszene von Tours. $^2/_3$ Aug. II. Rang.

Mittelgroß, kurz oval, nach unten etwas verjüngt, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch hellgelb, glänzend, fest, fein, nicht zu saftig, recht angenehm zuckersüß, Stein ablöslich, verschoben oval, unten vorgeschoben, schwach afterkantig. Baum groß, selten volltragend, sehr frühe Blüthen. L. II. H. S. 217.

339. Sämling der Johannespflaume. I. Generation.

I. Baum. $^1/_2$ Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, oval-rund, nach unten etwas verjüngt, dunkelblau, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, zart, etwas härtlich, überfließend vom Saft, schmelzend, sehr lieblich, äußerst süß, Stein unablöslich, ovalrund, oben abgerundet kurz spitz, unten stumpfspitz. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1841. S. 291.

419. Von Trapp's Königspflaume. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, schwarzblau, süß erhaben, Stein ablöslich, Baum mächtig. Monatschr. 1856. S. 412.

258. Keindl's Frühdamaszene. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, rund, dunkelblau, röthliche Spuren, gelbliche Punkte, Stiel mittellang, mäßig dick, behaart, Fleisch grünlich-gelb, zart, härtlich, äußerst saftig, schmelzend, lieblich, Stein unlöslich, oval-rund. B. n. Obstf. I. H. S. 122.

127. Blaue Dronet. E. Aug. II. Rang.

Klein, verschoben oval, schwarzblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch weißgelb, saftig, weich, schmelzend, etwas erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben einseitig spitz, unten abgerundet. Baum klein, fruchtbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 299.

369. Lenné's blaue Dronet. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmig-rund, dunkelviolett, Stiel lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, glänzend, saftig, recht angenehm

süß, Stein oval, unablöslich. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. 1844. S. 291.

198. Domina. E. Aug. II. Rang.

Klein, schwarzblau, rund, sehr süß, recht angenehm, Fleisch ablöslich. Monatschr. 1858. S. 7.

303. Shmith's Orleans-Pflaume. $^3/_3$ Aug. II. Rang.

Groß, oval, dunkelviolett, fast schwarzblau, Stiel kahl, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, süß parfümirt, Stein ganz unlöslich, oval, etwas afterkantig. B. u. Obstf. III. H. S. 24.

90. Späte schwarze Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Sehr klein, schwarzblau, ovalrund, nach unten etwas kleiner, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, etwas härtlich, saftig, fein, recht angenehm, aromatisch-süß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben kurz fein-spitz, unten stumpfspitz. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. 219.

263. Christ's Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Der vorstehenden Frucht sehr ähnlich. L. II. H. S. 224.

55. Italienische Damaszene. $^1/_3$ Sept. II. Rang.

Klein, eiförmig-rund, dunkelviolett, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, einseitig-eiförmig. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. 223.

70. Schwarze Muskateller. A. Sept. II. Rang.

Sehr klein, rundlich, schwarzblau, Stiel mittellang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, süß-aromatisch, Stein löslich, kurz oval, Baum mittelgroß, mitteltragbar. Syst. Anl. S. 229.

267. Onderka's Damaszene. $^1/_3$ Sept. I. Rang.

Groß, verschoben rundlich, schwarzblau mit goldfarbenen Punkten und Rostflecken, Stiel mittellang, dick, behaart, Fleisch grünlichgelb, saftig, härtig, süß aromatisch, Stein liegt hohl im Fleisch, einseitig oval, Baum kräftig, tragbar. Eine schöne, große Frucht, empfehlenswerth. Zerspringt im Regen nicht. B. u. Obstf. II. H. S. 37.

317. Wahre Caledonian. Goliath. 1/3 Sept. I. Rang.

Sehr groß, plattgedrückt rund, dunkelviolett-braun, goldfarbene Punkte, Stiel dick, mittellang, behaart, Fleisch weißlich-gelb, zähe, saftig, süß aromatisch, Stein ablöslich, rund oval. Baum tragbar, kräftig. B. u. Obstf. I. H. S. 126.

69. Normänische Damaszene. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, plattgedrückt-rund, nach unten verjüngt, oben schwarzblau, unten röthlich-blau, Stiel behaart, lang, Fleisch weiß-gelb, oft etwas röthlich-gelb, härtlich, sehr saftig, fein, erhaben aromatisch süß, bisweilen eine Spur einer Säure, Stein ablöslich, vorgeschoben umgekehrt eiförmig, oben breit abgerundet, unten schief stumpfspitz. Baum kräftig, mäßig tragbar. Eine große, oft sehr große, recht schöne und ausgezeitigt sehr gute Frucht. L. II. H. S. 225.

339. Sämling der Johannespflaume. I. Generation. II. Baum. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, unregulär umgekehrt eiförmig, schwarzblau, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, zart, überfließend vom Saft, sehr edel erhaben süß, Stein einseitig umgekehrt eiförmig, oben rund, unten stumpfspitz. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 309.

346. Später Perdrigon. 1/2 Sept. I. Rang.

Klein, oval-rund, nach unten abnehmend, dunkelblau, Stiel lang, behaart, Fleisch weißlich-gelb, etwas härtlich, sehr edel zuckersüß, Stein fast ablöslich, oval, oben fein scharfspitz, unten stumpfspitz. Baum mäßig groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 300.

201. September-Damaszene. E. Sept. II. Rang.

Klein, eiförmig, schwarzblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch grünlichgelb, saftig, etwas fest, recht angenehm süß, Stein ablöslich, eiförmig. Baum stark, tragbar. L. II. H. S. 229.

107. Norbert's Pflaume. Okt. I. Rang.

Sehr klein, plattgedrückt-rund, schwarzblau, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, fest, saftig, sehr edel zuckersüß, Stein

fast ablöslich, oval-rund, afterkantig. Baum mittelgroß, fast jährlich tragbar. Eine sehr kleine, delikate Frucht, hält sich am Baume bis im November. Fr. Bl. J. 1844. S. 350. L. II. H. S. 231.

226. Weichhaariger Schlehdorn. Okt. III. Rang.

Prunus pubescens Pours.

Sehr klein, oval-rund, schwarzblau, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, zusammenziehend süßlich, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitz. Strauch klein, tragbar. Die Frucht etwas größer, als die gemeine Schlehe. Fr. Bl. J. 1844. S. 310.

11½. Gemeiner Schlehdorn. L. Okt. III. Rang.

Prunus Spinosa.

Sehr klein, rund, schwarzblau, Stiel sehr kurz, kahl, Stein unablöslich, eiförmig-rund, afterkantig, Fleisch grünlich, weich, zusammenziehend säuerlich. Strauch klein. L. II. H. S. 232.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

197. Frühe Leipziger Damaszene. E. Juli. II. Rang.

Klein, oval-rund, nach unten etwas kleiner, dunkel-violett, Stiel lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, saftig, lieblich, zuckersüß, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum nicht groß, tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 132.

365. Rothe frühe Damaszene. E. Juli. II. Rang.

Fast mittelgroß, dunkel-rothbraun, oval-rund, nach unten etwas abnehmend, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelblich, etwas fest, brüchig, saftig, recht angenehm süß, Stein ablöslich, verschoben oval, Baum mittelgroß, tragbar. Ist der vorstehenden Frucht sehr ähnlich. L. II. H. S. 230.

68. Hofinger's rothe Mirabelle. A. Aug. II. Rang.

Sehr klein, oval, unten kleiner, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, saftig, weich, angenehm süß, Stein

fast ablöslich, oval, oben spitz, unten stumpf. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. 234.

331. Hochheits-Pflaume vom Monat August. 1/3 Aug.

II. Rang.

Klein, oval, hellroth, Geschmack gut, Stein ablöslich.

417. Bancalari's rothe Frühdamaszene. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, roth, rund, süß, erhaben aromatisch, delikat, Stein ablöslich, der Vermehrung werth. Monatschr. 1856. S. 411.

418. Frühe, rothe Königspflaume. 1/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, roth, süß, erhaben aromatisch, delikat, sehr schön, regulär gebaut, Stein ablöslich, Baum reichlich tragbar. Monatschr. 1856. S. 411.

67. Diel's Königspflaume. I. Rang.

Groß, roth, ovalrund, in Allem der Königspflaume von Tours sehr ähnlich, nur etwas kleiner, zeitigt um acht Tage später. B. n. Obstf. III. H. S. 46.

185. Schöne des September. E. Sept. I. Rang.

Groß, ovalrund, violett, zahlreich gelbliche Punkte, Stiel sechs Linien lang, dünn, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein hart ablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. 43.

141. Lucas's Königspflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, oval-rund, blauroth, gelbliche Punkte sehr gedrängt, Lederflecken, Stiel zehn Linien lang, ziemlich dick, rostig, sehr kurz behaart, Fleisch weißgelb, etwas zähe, sehr saftig, süß erhaben, Stein unablöslich, oval, rauh, afterkantig, Baum sehr kräftig, sehr tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 138.

338. Rothes Taubenherz. 1/3 Aug. II. Rang.

Sehr klein, eiförmig-rund, hellroth, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelblich, zart, weich, angenehm süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig, oben spitz. Baum gemäßigt, strotzend tragbar. L. II. H. S. 236.

138. Waran Erik. 1/3 Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, ovalrund, unten verjüngt, rothblau, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch gelb, fast goldgelb, härtlich, nicht zu saftig, fein aromatisch zuckersüß, Stein unablöslich, oval, oben rund, etwas spitz, unten vorgeschoben spitz, Baum stark, fruchtbar. Köstliche Frucht. B. u. Obstf. III. H. S. 133.

40. Königspflaume von Tours. 2/3 Aug. I. Rang.

Groß, verschoben oval-rund, unten kaum merklich verjüngt, rothblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, lieblich und angenehm süß, mit etwas merklicher Weinsäure, Stein ablöslich, fast regulär oval, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, äußerst tragbar. Die erste große gute Frucht des Sommers. L. II. H. S. 241.

53. Königspflaume. 1/2 Aug. I. Rang.

Groß, plattrund, dunkelroth-blau, Stiel behaart, lang, Fleisch weiß-gelb, härtlich, etwas gröblich, etwas durchsichtig, glänzend, mäßig saftig, sehr angenehm erhaben, überaus honigsüß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben stark abgerundet, unten etwas verjüngt abgestutzt. Baum mittelgroß, tragbar. Darf in keinem Garten fehlen. L. II. H. S. 243.

46. Mayer's Königspflaume. E. Aug. I. Rang.

Fast groß, oval-rund, unten kaum merklich kleiner, blauroth, Stiel lang, behaart, Fleisch weiß-gelb, durchsichtig, strahlig, zart, schmelzend, saftreich, angenehm erhaben weinsäuerlich, Stein fast ablöslich, verschoben oval, oben mehr als unten abgerundet. Baum groß, mäßig fruchtbar. L. II. H. S. 246.

205. Königin Victoria. Nr. I. A. Sept. I. Rang.

Groß, rund, hellroth, graue Punkte zerstreut, Stiel sieben Linien lang, dick, dünn behaart, Fleisch gelb, sehr saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, oval, Baum gemäßigt, tragbar. B. u. Obstf. III. H. S. 39.

286. Thomaspflaume. 3/3 Aug. I. Rang.

Groß, oval, blaßroth, graue Punkte, Stiel lang, behaart,

Fleisch gelb, nicht saftig, brüchig, süß angenehm, Stein gut löslich, einseitig oval, stark afterkantig, Baum tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 44.

409. Karl Koch's Königspflaume. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Gut mittelgroß, rundlich, blauroth, viele goldfarbene Punkte, Stiel fünf Linien lang, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, härtlich, süß, aromatisch, Stein löslich, oval, Backen afterkantig, Baum mächtig, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. 43.

149. Procureur. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, renllodenartig, hellroth, schwach punktirt, Stiel kurz, behaart, Fleisch weißlich, glänzend, saftig, härtlich, süß, delikat, Stein ablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig, Baum mäßig fruchtbar. Renklode. B. n. Obstf. I. H. S. 135.

406. Siebenfreund's Königspflaume. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, ovalrund, röthlichbraun mit vielen goldenen Punkten, Stiel sehr lang, behaart, dünn, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, süß, Stein löslich, klein, verschoben oval, Baum mäßig fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. 41.

50. Pflaume von Montfort. $^3/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, dunkelviolett, ovalrund, unablösliches Fleisch, weich, zart, süß, etwas gewürzt. Monatschr. 1858. S. 282.

296. Chenectady Catharine. E. Aug. I. Rang.

Groß, ovalrund, grünlichgelb, stark rothangelaufen, gut vom Steine löslich, fein, äußerst angenehm, aromatisch. Monatschr. 1858. S. 7.

110. Blaue Renklode. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, oben mehr als unten gedrückt, rothblau, Stiel behaart, lang, Fleisch gelblich-weiß, glänzend, strahlig, durchsichtig, härtlich, saftig, angenehm fein weinsäuerlichsüß, Stein ablöslich, oval, oben stark gerunget, unten stumpfspitz, stark afterkantig. Baum kräftig, recht fruchtbar. L. II. H. S. 248.

143. Valenciennes. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rund, rothblau, goldfarbene Punkte, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, süß, aromatisch, delikat, Stein klein, ablösbar, einseitig oval, Baum große Kronenblätter, recht gute, empfehlenswerthe Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. 45.

304. Columbia. A. Sept. I. Rang.

Mittelgroß bis sehr groß, plattgedrückt rund, braunroth, goldfarbene Punkte, Stiel dünn, kahl und lang, Fleisch weißgelblich, härtlich, saftig, süß, Stein löslich, oben abgerundet, unten stumpfspitz, etwas afterkantig, Baum groß und tragbar. Eine sehr empfehlenswerthe Frucht. Monatschr. 1855. S. 282.

31. Hyazinthpflaume. A. Sept. I. Rang.

Fast groß, kurz eiförmig-rund, rothblau, fast dunkelblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch goldgelb, etwas härtlich, zart, schmelzend, recht angenehm erhaben zuckersüß, Stein nicht gut ablöslich, oval, oben schief abgerundet, unten vorgeschoben stumpf. Baum stark, fruchtbar. Zu empfehlen. Fr. Bl. J. 1844. S. 315.

5. Violetter Perdrigon. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast mittelgroß, kurz oval, nach unten kleiner, violett, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, fast goldgelb, sehr saftig, zart, äußerst erhaben süß, Stein nicht gut ablöslich, einseitig oval, unten verjüngt, Baum mittelgroß, ziemlich fruchtbar. Eine edle Frucht. L. II. H. S. 251.

280. Spanische Damaszene. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, stark plattgedrückt-rund, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, etwas härtlich, erhaben süß, Stein ablöslich, fast rund, etwas afterkantig. Baum stark, tragbar, sehr frühe Blüthe. Gute Frucht. L. II. H. S. 234.

152. Neue Herrenpflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, plattgedrückt-rund, oben flächer als unten, Stiel dicht behaart, lang, Fleisch goldgelb, zart, etwas

härtlich, saftig, doch etwas brüchig, recht angenehm erhaben süß, Stein fast ablöslich, einseitig oval. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. L. II. H. S. 256.

234. Prinz von Wales. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, bläulichroth, mit einzelnen Punkten, Stiel behaart, dünn, Fleisch goldgelb, weich, sehr saftig, aromatisch, Stein nicht gut löslich, ovalrund, die Backen etwas afterkantig. Der Baum wächst kräftig, dicht belaubt mit kurz ovalen Blättern, strotzend tragbar. Eine delikate Frucht, der Aufmerksamkeit werth. B. u. Obstf. III. H. S. 42. Monatschr. 1855. S. 73.

148. Die Schöne von Riom. $^3/_3$ Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, blaßroth mit dicht zerstreuten goldfarbenen Punkten und manchmal gelben Flecken, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, härtlich, saftig, süß, Stein gut-löslich, oval, der Baum groß, trägt reichlich. Die Frucht ist zwar schön und groß, wird aber wegen der späten Zeitigung von der gemeinen Zwetsche verdrängt. B. u. Obstf. I. H. S. 139.

461. Keindl's violette Königspflaume. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Frucht mehr als mittelgroß, oval, violettroth, viele kleine goldfarbige Punkte, Stiel mittellang, haarig, Fleisch gelb, saftig, äußerst aromatisch-süß, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, Baum mittelgroß, tragbar. Ist eine vorzügliche Pflaume, aller Vermehrung werth. Monatschr. 1861.

Der Verfasser erzog diese Frucht aus dem Stein der aprikosenartigen Pflaume und widmet sie den pomologischen Verdiensten des Herrn Augustin Keindl, Besitzer der Dr. G. Liegel'schen Gärten zu Braunau am Inn.

316. Rothes Herbst-Zeiberl. Okt. III. Rang.

Sehr klein, eiförmig-rund, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, zart, saftig, angenehm süß-feinweinsäuerlich, Stein unablöslich, oval, Baum groß, strotzend tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 341.

235. Späte von Chalons. Okt. II. Rang.

Klein, ovalrund, rothbraun, Stiel kahl, lang, Fleisch weißgelb, zart, etwas fest, saftig, recht angenehm süß, Stein unablöslich, oval, Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. J. 1844. S. 324.

223. Coë's sehr späte rothe Pflaume. Okt. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt-rund, rothbraun, Stiel lang, behaart, Fleisch weiß-gelb, härtlich, sehr saftig, glänzend, sehr erhaben aromatisch rein zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben oval, nach unten etwas abnehmend, Baum mittelgroß, tragbar. Vortreffliche Frucht. Fr. Bl. J. 1847.

208. Violette Oktoberpflaume. Okt. I. Rang.

Ist der vorstehenden Frucht sehr ähnlich. Beide gleichen viel der Schweizerpflaume Nr. 61, sowohl in der Farbe, Größe, Form, Zeitigung, als auch im Geschmack, diese ist aber nach unten stark verjüngt, ihr Baum hat kahle Sommerzweige. L. II. H. S. 153.

122. Louisen's braune Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Luise brune.

Frucht mittelgroß, plattgedrückt-rund, dunkelroth, zahlreich goldartige Punkte, Stiel mittellang, haarig, dick, braun, Fleisch gelb, saftig, recht angenehm, aromatisch-süß, Stein klein, oval, ablöslich, Baum kräftig, tragbar. Monatschr. 1861.

Der Baum aus Morizburg bei Dresden.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

415. Flotow's früheste Mirabelle. E. Juli. I. Rang.

Eine sehr kleine, runde Damaszene, mit einem ablöslichen Stein und einem zarten, aromatischen, süßen Fleische. Sie gehört zu den frühesten Pflaumen, ist lieblich, schön und delikat. Eine wahre Bereicherung der Pomologie. Der kleine Baum scheint tragbar. Monatschr. 1856. S. 411.

282. Hudson's gelbe Frühpflaume. 1/3 Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, kurzoval, wachsgelb mit grünlichen Spuren, Stiel dick, einen halben Zoll lang, kahl, Fleisch glänzend, gelb, saftig, von recht gutem Wohlgeschmack, Stein löslich, oval, der Baum hat kräftige Vegetation mit großen Blättern. Eine gute, sehr frühe Frucht, jedoch klein. B. u. Obstf. III. H. S. 46.

6. Doppelte Mirabelle, Goldpflaume. 1/2 Aug. I. Rang.

Klein, gelb, plattgedrückt-rund, nach unten kaum merklich kleiner, Stiel behaart, mittellang, Fleisch hochgelb, trübe, sehr zart, schmelzend, saftig, aromatisch äußerst süß, Stein einseitig-oval, oben rund, unten etwas vorgeschoben-stumpfspitz, Baum nicht groß, empfindlich, nicht reichlich tragbar. Späte kleine Blüthe. Eine kleine aber sehr köstliche Frucht. L. II. H. S. 258.

176. Braunauer neue Aprikosenpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, oval, nach unten kleiner, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelblich, saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, oval. Baum mittelgroß, tragbar. Aus Stein erzogen. Fr. Bl. J. 1844. S. 354.

102. Marillenpflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, ovalrund, unten etwas verjüngt, Stiel haarig, lang, Fleisch grünlich-gelb, saftig, weich, trübe, ziemlich angenehm süß, Stein oval, oben schief abgerundet, unten etwas verjüngt. Baum stark, äußerst tragbar. Fr. Bl. J. 1847.

221. Lucombé's Unvergleichliche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, oval-rund, nach unten abnehmend, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, weich, schmelzend, saftig, angenehm süß, doch bisweilen etwas matt, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten stumpfspitz. Baum kräftig, tragbar, frühe kleine Blüthe. Fr. Bl. J. 1844. S. 341.

12. Gelbe Mirabelle. E. Aug. II. Rang.

Prunus Syriaca Borkh.

Sehr klein, kurz oval, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb,

fest, zart, nicht allzu saftig, sehr lieblich erhaben aromatisch zuckersüß, Stein ablöslich, oval, oben und unten ziemlich gleichspitz. Baum klein, strotzend tragbar. Eine Art, sehr kleine Blüthen, eine delikate Frucht, sowohl frisch als getrocknet. L. II. H. S. 261.

352. Oberdieck's frühe Aprikosenpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattrund, weißgelb, etwas grünlichgelb, weißliche zerstreute Punkte, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlichgelb, durchsichtig, glänzend, saftig, süß, erhaben aromatisch, Stein unablösbar, oval, etwas afterkantig, Frucht sehr schön, regulär gebaut. B. u. Obstf. III. H. S. 47.

328. Lange's Aprikosenpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Stark mittelgroß, plattrund, aprikosenartig röthlichgelb, viele rothe Punkte und Flecken, Stiel dick, mittellang, behaart, Fleisch gelb, überfließend, zart, süß, erhaben aromatisch, Stein unablösbar, oval, afterkantig, schöne prachtvolle Frucht. B. u. Obstf. III. H. S. 48.

135. Washington. A. Sept. I. Rang.

Sehr groß, ungestaltet oval, nach unten kaum etwas verjüngt, grünlich-gelb, mit einem rosenrothen Anflug, Stiel behaart, lang, Fleisch goldgelb, weich, faserig, brüchig, saftig, schmelzend, angenehm süß, bisweilen etwas matt, Stein ablöslich, einseitig oval, oben abgerundet, unten vorgeschoben, abgestutzt, afterkantig, Baum sehr groß, dicke Zweige, sehr große Blätter, frühe Blüthe, mäßig tragbar. L. II. H. S. 263.

132. Peter's große gelbe Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, gelb, verschoben, etwas vierseitig, plattgedrückt-rund, nach oben kaum merklich kleiner, Stiel lang, haarig, Fleisch gelb, sehr saftig, äußerst zart und schmelzend, doch etwas härtlich, überaus lieblich aromatisch zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben oval-eiförmig, oben spitz, unten abgerundet. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. 266.

174. Reine-Claude Diaphane. $^2/_3$ Sept. I. Rang.

Stark mittelgroß, rundlich grün, stark roth-gefleckt, erhaben aromatisch, Stein nicht gut ablöslich, edle Frucht, aller Aufmerksamkeit werth. Monatschr. 1856. S. 409.

387. Chenectady. E. Aug. I. Rang.

Klein, fast rund, grünlich-gelb, stark rothpunktirt-gefleckt, unablöslich, delikat. Monatschr. 1858. S. 8.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

219. Grüne Mirabelle. E. Aug. I. Rang.

Sehr klein, gelblich-grün, etwas braunlich angelaufen, kugelrund, unten platt, Stiel sehr kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, saftig, schmelzend, recht lieblich aromatisch zuckersüß, Stein unablöslich, oval-rund, oben und unten abgerundet, Baum klein, strotzend tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 342.

250. Grüner Schlehdorn. Okt. III. Rang.

Sehr klein, plattgedrückt-rund, grün, etwas röthlich angelaufen, Stiel sehr kurz, kahl, Strauch klein. Die Frucht hat den Werth der grünen Schlehe. Fr. Bl. J. 1844. S. 242.

54. Vasser's Renklode. $^2/_3$ Aug. I. Rang.

Mittelgroß, rund, oben und unten plattgedrückt, grünlichgelb, kleine, weiße Punkte, mehr rothe Punkte und Flecken, Stiel zehn Linien lang, kurz behaart, dick, Fleisch weißgelb, härtlich, glänzend, saftig, zuckersüß erhaben, Stein nicht ganz ablösbar, oben abgerundet, unten stumpfspitz, stark afterkantig. B. n. Obstf. I. H. S. 111.

158. Neue weiße Kaiserin. E. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgedrückt rund, weißlich-grün, viele weißliche rostige Punkte, Stiel sieben Linien lang, dick, kurz behaart, Fleisch gelblich grün, überfließend, zart, überaus süß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, oval, schwach afterkantig, Baum gemäßigt, tragbar. Fr. Bl. 1850. S. 388.

386. Alois's Renklode. A. Sept. I. Rang.

Reine-Claude d'Alois.

Frucht stark mittelgroß, renklodeförmig, grünlich, rothpunktirt-gefleckt, Stiel behaart, mittellang, dick, Fleisch gelb, saftig, härtlich, äußerst zuckersüß erhaben, Stein oval, ablöslich, einseitig, Baum gemäßigt, fruchtbar. Eine vortreffliche Renklode, der großen, grünen Renklode ganz ähnlich. Monatschr. 1861.

Zweige von Herrn Oberdieck aus Jenisen bei Hannover.

170. Verlorne Sohn. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, malerisch schön weißgelb, röthlich angelaufen, rothe Punkte und Streifen, Stiel kurz, behaart, dünn, Fleisch weißgelb, zart, saftig, süß erhaben aromatisch, Stein unlöslich, oval. Eine schöne gute Frucht, doch etwas klein und unablöslich. B. n. Obstf. I. H. S. 150.

17. Rothe Jungfer-Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Fast mittelgroß, gelb, stark gefleckt, umgekehrt-eiförmig-rund, nach unten stark abnehmend, Stiel haarig, mittellang, Fleisch weißgelb, etwas durchsichtig, fein, härtlich, saftig, äußerst erhaben gewürzhaft süß, Stein ablöslich, verschoben oval-lanzettförmig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. L. II. H. S. 269.

269. Bunte Frühpflaume. E. Juli. II. Rang.

Klein, ovalrund, grünlichgelb, hellroth angelaufen, kleine weißgraue Punkte wenig, Stiel zehn Linien lang, dünn, behaart, Fleisch gelb, saftig, zart, bisweilen mehlig, süß, aromatisch, Stein ablöslich, aderig, Baum groß, äußerst tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 118.

264. Neuer Perdrigon. 3/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rundlich, malerisch schön, lange hellweißgelb, später blaß, zuletzt dunkelgelb, rothe Punkte und Flecken, Stiel mittellang, behaart, dick, Fleisch hellgelb, härtlich, nicht übersaftig, süß, aromatisch, Stein löslich, oval, schwach afterkantig, Baum gemäßigt, tragbar, eine sehr schöne und gute, aber späte Frucht. B. n. Obstf. I. H. S. 151.

Notizen.

Sehr große Früchte.

Zwetschen.

Blaue. 67. Diamantpflaume. 71. Siebenbürger-Zwetsche. 450. Riesenzwetsche. 104. Italienische Zwetsche. 94. Cooper's große, rothe Zwetsche. 318. Goliath. 419. Trapp's Königspflaume. 402. Rodt's blaue Zwetsche. 150. Herrenhauser Eierpflaume. 207. Große blaue Zwetsche. 160. Dörrell's neue große Zwetsche. 207. Große blaue Zwetsche von der Worms. 33. Blaue Eierpflaume.

Rothe. 8. Rothe Kaiserpflaume. 32. Rothe Eierpflaume. 57. Violette Jerusalemspflaume. 73. Dörrell's neue Purpurzwetsche. 164. Nienburger Eierpflaume. 169. Pond's Sämmling. 206. Hackl's große Zwetsche. 224. Isabella.

Gelbe. 21. Gelbe Eierpflaume. 27. Gelbe Jerusalemspflaume. 349. Jahn's Jerusalemspflaume. 220. Coë's rothgefleckte Pflaume.

Damaszenen.

Blaue. 96. Normännischer Perdrigon. 317. Caledonian Plum (Goliath). 322. Kirke. 185. Schöne des September. 267. Onderka's Damaszene.

Rothe. 7. Damaszene von Maugerou. 86. Schamal's Herbstpflaume. 103. Rothe Nektarine. 141. Lucas's Königspflaume.

Gelbe. 82. Große weiße Damaszene. 126. Hlubek's Aprikosenpflaume. 135. Washington.

Grüne. 243. Renklode von Jodoigne.

Sehr kleine Früchte.

Zwetschen.

Blaue. 111. Brünner Zwetsche. 320. Kleine blaue Frühzwetsche. 428. Firbas's frühe Schüttenhoferin.

Rothe. 123. Rothes Zeiberl.

Gelbe. 84. Phiolenartige gelbe Zwetsche.
Grüne. 156. Kleine grüne Zwetsche. 217. Traubenpflaume.

Damaszenen.

Blaue. 107. Norbert's-Pflaume. 175. Hauptmann Kirchhof. 70. Schwarze Muskateller. 354. Frühe Schwarze.
Rothe. 19. Rothe Mirabelle. 68. Hofinger's rothe Mirabelle. 316. Rothes Herbstzeiberl.
Gelbe. 6. Goldpflaume. 12. Gelbe Mirabelle. 297. Rangheri's gelbe Mirabelle. 415. Flotow's früheste gelbe Mirabelle. 209. Ark's doppelte Mirabelle. 327. Bohn's gestreifte Mirabelle.
Grüne. 167. Grünes Zeiberl. 219. Grüne Mirabelle.
Bunte. 91. Brisette.

Sehr frühe Früchte.

Zwetschen.

Rothe. 288. Rother Spilling. 376. Biondek's rothe Frühzwetsche.
Gelbe. 41. Katalonischer Spilling. 65. Gemeiner Spilling. 88. Skanarda.
Grüne. 307. Heupflaume.

Damaszenen.

Blaue. 35. Johannespflaume.
Rothe. 68. Hofinger's rothe Mirabelle. 125. Friedheim. 138. Waran Erik. 197. Leipziger Damaszene. 365. Rothe Frühdamaszene.
Gelbe. 282. Hudson's gelbe Frühpflaume. 415. Flotow's früheste gelbe Mirabelle. 42. Gelbe Diaprée.

Sehr späte Früchte.

Zwetschen.

Blaue. 51. Dunkelblaue Kaiserin. 60. Unvergleichliche. 97. Nikitaer Spätzwetsche.
Gelbe. 21. Gelbe Eierpflaume. 59. Große gelbe Dattelzwetsche. 355. Gelbe Spätzwetsche.

Damaszenen.

Blaue. 107. Norbertspflaume. 306. Herbstpflaume.
Rothe. 61. Schweizerpflaume. 86. Schamal's Herbstpflaume. 208. Violette Oktoberpflaume. 223. Coë's sehr späte rothe Pflaume. 235. Späte von Chalon's. 316. Rothes Herbstzeiberl.
Gelbe. 48. Gelbe Katharinenpflaume. 105. Downton's Kaiserin. 278. Koch's gelbe Spätdamaszene. 397. Katharinenpflaume mit bunten Blättern.
Grüne. 63. St. Klara. 29. Renklode von Bavay.
Bunte. 91. Brisette.

Sehr tragbare Früchte.

Zwetschen.

Blaue. 11. Gemeine Zwetsche. 450. Riesenzwetsche. 124. Violette Diaprée. 210. Eugen Fürst's Frühzwetsche. 261. Wangenheim's Pflaume.
Rothe. 47. Rothe Zwetsche. 57. Violette Jerusalemspflaume.
Gelbe. 21. Gelbe Eierpflaume.

Damaszenen.

Blaue. 15. Johannespflaume. 107. Norbertspflaume. 175. Hauptmann Kirchhof.
Rothe. 40. Königspflaume von Tours. 197. Leipziger Damaszene. 365. Rothe Frühdamaszene. 374. Haffner's Königspflaume.
Gelbe. 12. Gelbe Mirabelle. 82. Große weiße Damaszene. 101. Braunauer aprikosenartige Pflaume.
Grüne. Jaspisartige Pflaume. 307. Heupflaume.

Sehr schöne Früchte.

Zwetschen.

Rothe. 294. Sharp's Kaiserpflaume.
Gelbe. 398. Bernsteinzwetsche. 43. Reizenstein.
Bunte. 203. Marmorirte Eierpflaume.

Damaszenen.

Blaue. 185. Schöne des September. 53. Königspflaume.

Rothe. 1. Rothe Kirschpflaume. 103. Rothe Nektarine. 139. Schöne von Riom.

Gelbe. 20. Gelbe Aprikosenpflaume. 239. Gelbe Kirschpflaume. 328. Lange's Aprikosenpflaume.

Bunte. 36. Bunter Perdrigon. 108. Rothe Aprikosenpflaume. 170. Verlorner Sohn.

Ueber den Werth einer Pflaumensteinsammlung.

Die Steine der Pflaumen geben weit bessere, mehrere und schärfere Merkmale zur Erkenntniß und Beschreibung derselben, als die äußeren Merkmale der Frucht, nemlich die Größe, Form und Farbe.

a) Man betrachtet die obere und untere Seite des Steines, seine Spitze oder Abrundung, mitten oder seitwärts gestellt, lang, kurz, scharf, spitz, stumpf, vorgeschoben.

b) Die Rückenkanten drei, eine Mittelkante, zwei Nebenkanten, bisweilen abgesondert, bisweilen wenig bemerkbar, sind bald genähert, bald aprikosensteinartig erhoben und weit abgesondert; die Mittelkante meist erhoben, stumpf oder scharf, nach unten oft erweitert, neben den äußern Kanten befinden sich bisweilen an den Backen charakteristisch mehr und weniger tiefe Furchen.

c) Ueber den Bauch laufen zwei Kanten, bald offen, bald halb geschlossen zackig, stumpf, scharf, deren Furche bald enge, weit, tief. Die Rücken- und Bauchkanten sind bald mehr und weniger nach oben, nach der Mitte oder nach unten mehr ausgebogen.

d) Die Backen glatt, rauh, narbig, afterkantig, gewölbt, flach, an der Basis oft mehrere, erhobene Kanten.

e) Die Form des Steines rund, oval, eiförmig, länglich, lanzettförmig, flach, gewölbt, Rücken- oder Bauchkante oft mehr erweitert, fast gerade oder stark ausgebogen, der größte Durchmesser nach oben, in der Mitte nach unten.

f) Die Größe nach dem Maßstabe, indem oft große Früchte

kleine Steine, und umgekehrt haben. Man sagt daher auch, der Stein ist nach der Größe der Frucht klein, groß.

g) Eine ächte Pflaumensteinsammlung dient für alle Zeiten als Probierstein, als Kriterium der Aechtheit derselben; z. B. man erhält die Pflaume Isabella und man zweifelt an ihrer Aechtheit, so vergleiche man ihre Steine und sogleich ist Gewißheit da.

h) Wenn ein Schriftsteller Pflaumenabbildungen liefert, so ist durchaus nothwendig, daß auch ihre Steine mit den charakteristischen Merkmalen beigegeben werden; jenem wird eine ächte Pflaumensteinsammlung von größtem Nutzen sein, in der er zu jeder Zeit das Original zur Hand nehmen kann. Bei Vergleichung der Beschreibungen der Pflaumen von verschiedenen Autoren ist diese Sammlung von sehr wesentlichem Nutzen. Der Verfasser hat während dreißig bis vierzig Jahren mehr als hundertmale seine Sammlung zur Hand genommen, um aus dem Wirrwarr der Benennungen der Früchte in's Reine zu kommen.

Pflaumen,

welche gegenwärtig angepflanzt sind.

(I. bezeichnet den ersten, II. den zweiten und III. den dritten Rang.)

I. Klasse.

Die Zwetschen.

Mit länglich-eiförmigen Früchten.

I. Ordnung.

Die wahren Zwetschen.

Mit kahlen Sommerzweigen.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

2. II. Violette Dattelzwetsche, A. Sept.
11. I. Gemeine Zwetsche, E. Sept.
56. I. Violette Kaiserin, E. Sept.
60. I. Unvergleichliche, Okt.
71. I. Siebenbürger Zwetsche, E. Sept.
94. I. Cooper's neue große Zwetsche, A. Sept.
96. I. Englische Zwetsche, E. Sept.
97. II. Nikitaer Spätzwetsche, Gus al Erik, M. Sept.
100. I. Wahre Frühzwetsche, E. Aug.
104. I. Italienische Zwetsche, M. Sept.
116. I. Große englische Zwetsche, M. Sept.
129. I. Liegel's Frühzwetsche, E. Aug.
140. I. Dunkelblaue Eierpflaume, M. Sept.
150. I. Herrenhauser Eierpflaume, E. Aug.
155. I. August-Zwetsche, M. Sept.
160. I. Dörrell's neue große Zwetsche, A. Sept.
190. II. Neue Agener Pflaume, E. Sept.
207. II. Große blaue Zwetsche von der Worms, M. Sept.
210. I. Eugen Fürst's Frühzwetsche, M. Sept.
238. I. Große, blaue Nikitaer Zwetsche, E. Aug.
240. II. Alibuchari, E. Aug.
261. I. Wangenheim's Pflaume, E. Aug.
270. I. Große Frühzwetsche, M. Sept.
309. I. Dollaner Zwetsche, E. Sept.
334. I. Wiesinger'sche Zwetsche, E. Sept.
344. I. Buhl Eltershofen, E. Aug.
364. I. Ungarische Dattelzwetsche, E. Sept.
383. I. Glocke, M. Sept.
399. I. Rossy's frühe gemeine Zwetsche, E. Sept.
402 1/2 I. Rodt's blaue Zwetsche, M. Sept.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

8. II. Rothe Kaiserpflaume, M. Aug.
13. I. Rothe Diaprée, A. Sept.
25. I. Spitzzwetsche, M. Aug..
32. II. Rothe Eierpflaume, E. Aug.
33. I. Blaue Eierpflaume, E. Sept.
57. I. Violette Jerusalemspflaume, (Wahre blaue Eierpflaume,) M. Sept.
73. II. Dörrell's neue Purpurzwetsche, E. Aug.
98. II. Nikitaer Dattelzwetsche, Bardak Erik, M. Aug.
119. I. Mailänder Kaiserpflaume, M. Sept.
121. II. Geisepflaume, E. Aug.
133. I. Rothe, prachtvolle Huling, E. Aug.
136. II. Wahre Hahnenhode, E. Aug.
137. I. Violette Kaiserpflaume, A. Sept.
147. II. Agener Pflaume, E. Aug.
164. II. Nienburger Eierpflaume, M. Sept.
166. I. Nikitaer Hahnenhode, A. Sept.
169. II. Pond's Sämmling, M. Sept.
206. I. Hackel's große Zwetsche, M. Sept.
226 1/2. I. Gartenzwetsche, E. Aug.
227. I. Rothe, süße Königspflaume, M. Aug.
255. I. Ruben's Burgunderzwetsche, E. Aug.
277. I. Berlepsch's violette Zwetsche, E. Aug.
293. II. Donauer's zusammengedrückte Zwetsche, M. Sept.
350. I. Schmidt's rothe Zwetsche, E. Aug.
357. II. Liegel's Zwetsche, M. Aug.
367. I. Porsch's rothe Zwetsche, M. Aug.
403. II. Abruzzen Zwetsche, E. Sept.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

21. II. Gelbe Eierpflaume, E. Aug.
27. II. Gelbe Jerusalemspflaume, M. Sept.
45. II. Gelbe Frühzwetsche, M. Aug.
59. II. Große, gelbe Dattelzwetsche, Okt.
66. II, Gelbe Marunke, A. Sept.
79. I. Kleine gelbe Eierpflaume, E. Aug.
84. II. Phiolenartige gelbe Zwetsche, E. Sept
88. II. Scanarda, A. Aug.
114. I. Wahre weiße Diaprée, A. Sept.
117. I. Dörrell's neue weiße Diaprée, A. Sept.
130. I. Hartwiß's gelbe Zwetsche, A. Sept.
220. I. Coë's rothgefleckte Pflaume, (Coë's golden Drop Plum.) E. Sept.
229. I. Pomeranzen-Zwetsche, M. Sept.
349. I. Jahn's gelbe Jerusalemspflaume, M. Sept.
355. I. Gelbe Spätzwetsche, Okt.
371. I. Waterloo-Pflaume, M. Sept.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

3. II. Italienische grüne Zwetsche, A. Sept.
80. II. Grüne Inselpflaume, A. Sept.
200. II. Holländische Zwetsche, M. Sept.
202. II. Große grüne Weinpflaume, M. Aug.
307. II. Frühe grüne Zwetsche, Bischtin Irek, A. Aug.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

302. I. Oberdieck's gestreifte Eierpflaume, A. Sept.

II. Ordnung.

Die Damaszenenartigen Zwetschen.

Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

9. I. Große Zuckerzwetsche, E. Aug.
51. II. Dunkelblaue Kaiserin, Okt.
64. I. Kleine Zuckerzwetsche, A. Sept.
67. II. Diamantpflaume, A. Sept.
85. II. Ransleben's Zwetsche, E. Sept.
111. II. Brünner Zwetsche, E. Sept.
118. II. Melniker Zwetsche, A. Sept.
124. I. Violette Diaprée, E. Aug.
146. III. Pflaume ohne Stein, E. Aug.
228. III. Jesum Erik, E. Aug.
257 I. Lucas's Frühzwetsche, M. Aug.
274. I Englische Frühzwetsche, M. Aug.
275. II. Bischofsmütze, M. Sept.
320. II. Kleine blaue Frühzwetsche, M. Aug.
332. I. Bazalicza's große blaue Zwetsche, E. Aug.
337. II. Blaue Kaiserin, M. Aug.
378. II. Dovauer's Pflaumen-Zwetsche, A. Sept.
407. I. Rodt's frühe große Zwetsche, E. Aug.
428. I. Firbas's Schüttenhoferin, A. Aug.
450. I. Riesenzwetsche, A. Sept.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

35. I. Rothe Renklode, E. Aug.
47. II. Rothe Zwetsche, M. Aug.
56. I. Violette Kaiserin, M. Sept.
81. I. Burgunder-Zwetsche, E. Aug.
181. II. Violette Kaiserpflaume mit bunten Blättern, A. Sept.
224. I. Isabella, A. Sept.
294. I. Sharp's Emperor, E. Aug.
313. I. Schamal's Frühzwetsche, E. Aug.
323. I. Mayerböck's Zwetsche, M. Aug.
370. I. Biondeck's rothe Frühzwetsche, A. Aug.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

10. II. Gelbe Zwetsche, E. Aug.
41. I. Katalonischer Spilling, E. Juli.
43. I. Reitzensteiner Zwetsche, E. Sept.
65. II. Gemeiner gelber Spilling, A. Aug.
163. II. Gisborne's Zwetsche, M. Aug.
315. I. Burchardt's gelbe Frühzwetsche, M. Aug.
329. I. Prachtvoller Hulling, M. Sept.
342. I. Bingham's Pflaume, E. Aug.
351. I. Kook's neue Diaprée, M. Aug.
373. I. Rudolph's Pflaume, E. Aug.
384. I. Blecker's gelbe Zwetsche, M. Aug.
394. I. Graf Gustav von Egger, A. Sept.
398. I. Bernstein-Zwetsche, E. Aug.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

23. II. Grüne, gestreifte Zwetsche, M. Sept.
92. II. Grüne Dattelzwetsche, M. Sept.
217. III. Traubenpflaume, M. Sept.
289. I. Buel's Lieblingszwetsche, M. Sept.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

38. III. Zweimal tragende Pflaume.
203. II. Marmorirte Eierpflaume, A. Aug.
209 1/2. II. Graugrüne Zwetsche, E. Aug.

II. Klasse.

Die Damaszenen.

Mit runden Früchten.

I. Ordnung.

Die zwetschenartigen Damaszenen.

Mit kahlen Sommerzweigen.

I. Unterordnung.

Mit blauen Früchten.

159. I. Lange violette Damaszene, E. Aug.
175. I. Hauptmann Kirchhoff, M. Aug.
186. II. Belgische Damaszene, M. Aug.
248. III. Blaue Krieche mit halbgefüllter Blüthe, A. Sept.
299. II. Blaue Weinpflaume, A. Sept.
306. I. Herbstpflaume, Okt.
322. I. Kirke, Anf. Sept.
340. I. Lepine, E. Sept.
410. I. Hauffer's Königspflaume, M. Sept.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

1. II. Rothe Kirschpflaume, M. Aug.
7. II. Damaszene von Mangerou, E. Aug.
14. I. Rother Perdrigon, M. Sept.
19. II. Rothe Mirabelle, M. Aug.
28. I. Schiebler's rothe Damaszene, E. Aug.
49. I. Violette Renklode, M. Sept.
61. I. Schweizer-Pflaume, Okt.
74. I. Mayer's rothe Damaszene, M. Aug.
86. I. Schamal's Herbstpflaume, E. Sept.
103. I. Rothe Nektarine, A. Aug.
115. I. Trauttenberg's rothe Aprikosenpflaume, A. Sept.
141. I. Lucas's Königspflaume, A. Sept.
185. I. Schöne des September, Sept. Okt.
205. I. Königin Viktoria, Nr. II., E. Aug.
211. I. Dochnahl's Damaszene, E. Aug.
236. I. Kölnische Pflaume, A. Sept.
241. I. Nikitaer frühe Königspflaume, E. Aug.
251. I. Liegel's Zwillingspflaume, A. Sept.
252. I. Trautenberg's Zuckersüße, M. Sept.
253. I. Berlet's frühe Damaszene, M. Aug.
266. I. Trummer's violette Damaszene, E. Aug.
301. I. Rothe Prinzen-Renklode, E. Aug.
314. I. Behren's Königspflaume, M. Aug.

345. I. Zahlbruckner's violette Damaszene, M. Aug.
374. I. Haffner's Königspflaume, E. Aug.
392. I. Prinzen's Kaiser-Renklode, A. Sept.
411. I. Walter's Pflaume, M. Aug.
449. I. Firbas's Königspflaume, E. Aug.

III. Unterordnung.
Mit gelben Früchten.

20. I. Gelbe Aprikosenpflaume, E. Aug.
24. I. Aprikosenartige Pflaume, M. Sept.
26. I. Weißer Perdrigon, E. Aug.
42. I. Weiße Diaprée, M. Sept.
44. I. Weiße Kaiserin, M. Sept.
48. I. Gelbe Katharinen Pflaume, E. Sept.
52. I. Frühe, gelbe Renklode, M. Aug.
72. I. Dörrell's neue Aprikosenpflaume, E. Aug.
82. II. Große, weiße Damaszene, E. Aug.
83. II. Kleine, weiße Damaszene, A. Sept.
101. I. Braunauer aprikosenartige Pflaume, A. Sept.
105. I. Downton's Kaiserin, Okt.
126. I. Hlubek's Aprikosenpflaume, E. Aug.
134. I. Weiße Kaiserpflaume, A. Sept.
139. II. Ottomannische Pflaume, E. Aug.
161. I. Aprikosenartige Mirabelle, M. Aug.
168. III. Prunus Cocomilia, M. Sept.
209. I. Ark's doppelte Mirabelle, A. Sept.
232. I. Geperlte Mirabelle, A. Sept.
239. III. Gelbe Kirschpflaume, M. Aug.
242. II. Ballonartige gelbe Damaszene, A. Sept.
278. I. Koch's gelbe Spätdamaszene, A. Sept.
292. I. Gelbe Prinzen Renklode, M. Aug.
297. I. Rangberi's gelbe Mirabelle, M. Aug.
361. II. Dühamel's große, weiße Damaszene, E. Aug.
375. I. Pflaume von St. Etienne, M. Aug.
397. I. Katharinenpflaume mit bunten Blättern, E. Sept.
404. I. Merold's gelbe Renklode, E. Sept.
421. I. Esperen's Goldpflaume, E. Aug.
448. I. Royer's Aprikosenpflaume, E. Aug.

IV. Unterordnung.
Mit grünen Früchten.

4. I. Echte, große Renklode, Aug.
29. I. Bavay's Renklode, M. Sept.
63. I. St. Klara, E. Sept.
95. II. Jaspisartige Pflaume, A. Sept.
99. I. Van Mons's Renklode, A. Sept.
106. II. Graugrüne Frühpflaume, M. Aug.
153. I. Durchsichtige, E. Aug.
165. III. Grüne Weinpflaume, E. Aug.
167. III. Grünes Zeiberl, E. Sept.
243. I. Renklode von Jodoigne, M. Sept.
281. I. Admiral Rigny, E. Aug.
324. I. Gonné's grüne Renklode, A. Sept.
325. I. Berlepsch's grüne Renklode, A. Sept.
376. I. Reine-Claude de Gigne, A. Sept.

V. Unterordnung.
Mit bunten Früchten.

36. I. Bunter Perdrigon, E. Aug.
108. I. Rothe Aprikosenpflaume, A. Sept.
191. II. Bunte Pflaume, A. Sept.
269. II. Bunte Frühpflaume, M. Aug.
305. I. Jefferson, M. Sept.
327. I. Bohn's gestreifte Mirabelle, M. Sept.

II. Ordnung.
Die wahren Damaszenen.
Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

I. Unterordnung.
Mit blauen Früchten.

111/2. III. Schlehdorn, Okt.
15. I. Johannes-Pflaume, E. Juli.
34. II. Große Damaszene von Tours, M. Aug.
39. II. Herrenpflaume, M. Aug.
55. II. Italienische Damaszene, A. Sept.
69. I. Normannischer Perdrigon, M. Sept.
70. II. Schwarze Muskateller, A. Sept.
107. I. Norbert's Pflaume, Okt.
186. I. Belgische Damaszene, E. Aug.
198. II. Domina, E. Aug.
201. II. September Damaszene, E. Sept.
226. III. Weichhaariger Schlehdorn, Okt.
258. I. Keindl's Damaszene, E. Aug.
259. I. Dieffenbach, M. Sept.
263. II. Christ's Damaszene, E. Aug.
267. I. Onderka, A. Sept.
283. I. Urbaneck's schwarze Damaszene, A. S.
303. II. Smith's Orleans-Pflaume, E. Aug.
311. I. River's Frühpflaume, A. Aug.
317. I. Wahre Caledonian, A. Sept.
346. I. Später Perdrigon, M. Sept.
347. I. Frühe blaue Renklode, M. Aug.
354. I. Frühe Schwarze, A. Aug.
416. I. Blaue Frühpflaume, A. Aug.
419. I. Trapp's Königspflaume, M. Aug.

II. Unterordnung.
Mit rothen Früchten.

5. I. Violetter Perdrigon, A. Sept.
31. I. Hyazintpflaume, A. Sept.
40. I. Königspflaume von Tours, M. Aug.
40 1/2. I. Diel's Königspflaume, E. Aug.
46. I. Mayer's Königspflaume, E. Aug.
50. I. Pflaume von Montfort, E. Aug.
53. I. Königspflaume, M. Aug.
68. II. Hofinger's rothe Mirabelle, A. Aug.
87. I. Freudenberger Pflaume, E. Aug.
110. I. Blaue Renklode, A. Sept.
125. I. Friedheim's rothe Frühdamaszene, E. Aug.
138. I. Waran Erik, A. Aug.
143. I. Valenciennes, A. Sept.
148. I. Schöne von Riom, E. Sept.
149. I. Procureur, E. Aug.
152. I. Neue Herrenpflaume, M. Sept.
197. II. Frühe Leipziger Damaszene, E. Juli.
205. I. Königin Viktoria, Nr. I. A. Sept.
208. I. Violette Oktoberpflaume, Okt.
223. I. Coë's späte rothe Pflaume, Okt.
234. I. Prinz von Wales, M. Sept.
235. II. Späte von Chalons, Okt.
280. I. Spanische Damaszene, M. Sept.
286. I. Thomaspflaume, E. Aug.
296. I. Cheneetady Catharine, E. Aug.
304. I. Columbia, A. Sept.
316. III. Rothes Herbst-Zeiberl, Okt.
341. I. Lallinger's Königspflaume, A. Sept.
365. II. Rothe Frühdamaszene, A. Aug.
406. I. Siebenfreund's Königspflaume, E. Aug.
409. I. Karl Koch's Königspflaume, E. Aug.
417. I. Bancalari's rothe Frühdamaszene, A. Aug.
418. I. Rothe frühe Königspflaume, A. Aug.

III. Unterordnung.
Mit gelben Früchten.

6. I. Goldpflaume, M. Aug.
12. I. Gelbe Mirabelle, E. Aug.
102. I. Morillenpflaume, E. Aug.
132. I. Peter's große gelbe Pflaume, M. Sept.
135. I. Washington, A. Sept.
174. I. Reine-Claude diaphane, M. Sept.
176. I. Braunauer neue Aprikosenpflaume, M. Aug.
282. I. Hudson's gelbe Frühpflaume, A. Aug.
328. I. Lange's Aprikosenpflaume, A. Sept.
352. I. Oberdieck's frühe Aprikosenpflaume, A. Sept.
415. I. Flotow's früheste Mirabelle, E. Juli.

IV. Unterordnung.
Mit grünen Früchten.

219. I. Grüne Mirabelle, E. Aug.
221. I. Frühe Renklode, M. Aug.
250. III. Grüner Schlehdorn, Okt.

V. Unterordnung.
Mit bunten Früchten.

17. I. Rothe Jungfernpflaume, M. Sept.
170. I. Verlorner Sohn, M. Aug.
264. I. Neuer Perdrigon, E. Sept.

Angepflanzte Pflaumen,
welche noch nicht hinlänglich geprüft sind.

171. St. Martin. 172. Königin Vilvorde. 179. Belle de Schönberg. 180. Gelbe Herrenpflaume. 279. Duane's Pourple. 363. Lavrence Early Red Plum. 3631/2. Lavrences Favorite. 388. Reine-Claude d'October. 412. Sämmling von 411. 413. Spitzpflaume. 422. Merveille de Neuyork. 424. Monstreuse d'Anglae terrè. 426. Oberdieck's rothe Renklode. 429. Albany beauty. 430. Autume Gage. 431. Conald's Janey. 432. Autum compote. 433. Bael's lòte green Gage. 435. Confes nota bene. 436. Denneston's red. 437. Guthier's Tay Blank. 438. Guthier's Tobaz. 439. Guthier's abricot. 440. Ickworth's incomparatrice. 441. Queen of Mother. 442. Washington pourple. 413. Long Scarlet. 444. Althan's rothe Renklode. 445. Heinrich's Sämmling. 446. Bullman's Sämmling. 451. Esmerold. 452. Standart of England. 453. Veleston black Gage. 454. Pomandre Plum. 455. Garuce de Veneka. 456. Early pro lific River's. 457. Prune des Brucettés. 458. Guthier's Fay Bank. 459. M. Langhlin. 460. Washington Bolmer.

Register.

Pflaumen.

A.

Abruzzen-Zwetsche 13
Admiral Rigny 45
Albani beauty 72
Alibuchari 2
Aprikosenpflaume, Braunauer neue 60
" Dörrel's neue 41
" gelbe 41
" Hlubek's 41
" Oberdieck's frühe 61
" Lange's 61
" rothe 47
" Royer's 41
" Trauttenberg's rothe 37
Augustzwetsche 3
Autumnel compote 72
" Gage 72

B.

Baet late green Gage 72
Bardak Erik 7
Belle de Schönberg 72
Bernstein-Zwetsche 27
Bischofsmütze 22
Bitschen Irek 29
Brisette 48
Buhl-Eltershofen 3

C.

Caledonian wahre 52
Chenectady 62
" Catharine 56

St. Clara 47
Coës Golden Drop Plum. 16
Columbia 57
Confes Nota Bene 72
Conalds Jancy 72

D.

Damaszene, ballonartige gelbe 42
" " rothe 36
" belgische 48
" Christ's 51
" Dieffenbach's schwarze 49
" Dochnahl's 34
" Dühamel's große weiße 40
" Friedheim's rothe 35
" frühe Leipziger 53
" große weiße 40
" italienische 51
" kleine weiße 42
" lange violette 31
" Luisen's braune 59
" Mayers rothe 33
" von Maugerou 36
" normänische 52
" Onderka's 51
" rothe frühe 53
" runde rothe 36
" Schiebler's rothe 34
" spanische 57
" späte schwarze 51
" von Tours große 50
Damaszene Trummer's violette 34
" Urbanek's schwarze 30
" Zahlbruckner's violette 38
Dattelzwetsche große gelbe 16
" grüne 28
" Nickitaer 7
" ungarische 5

Dattelzwetsche violette 5
Denestons red 72
Diamantpflaume 21
Diaprée, Dörrell's neue weiße 14
" Georgswalder 27
" Kook's neue 26
" rothe 11
" violette 20
" weiße 43
" " wahre 14
Domina 50
Downton's Kaiserin 44
Dronet blaue 50
" " Lennés 50
Duane's pourple 72
Durchsichtige 44

E.

Early prolific River's 72
Eierpflaume blaue 12
" dunkelblaue 32
" gelbe 14
" " kleine 13
" Herrenhäuser 3
" marmorirte 29
" Nienburger 12
" Oberdieck's gestreifte 18
" rothe 9
" Esmerold 72

F.

Frost Gage 13
Frühdamaszene Bancalari's rothe 54
" blaue 49
" Gustav Berlet's 33
" Keindl's 50
Frühe Schwarze 49
Frühpflaume bunte 63
" graugrüne 44

Frühpflaume Hudson's gelbe 60
" River's 49
Frühzwetsche Biondeck's rothe 23
" Burchhardt's gelbe 26
" Eugen Fürst's 20
" gelbe 13
" große 5
" kleine blaue 19
" Liegel's 3
" Lucas's 19
" Nickitaer blaue 1
" Schamal's 8
" Radlkofer's rothe 24
" wahre 2

G.

Gabelpflaume Firbas's 49
Galissioniére 37
Gartenzwetsche 9
Garuce de Veneka 72
Geisepflaume 10
Glocke 5
Goldpflaume 60
Goliath 52
Graf Gustav von Egger 27
Gus Erik 1
„ al Erik
Guthrier's apricot 72
" Tay blank 72
" Topaz 72

H.

Haferpflaume echte 2
Hahnenhode Nickitaer 11
" wahre 9
Hauptmann Kirchhof's Pflaume 32
Hauszwetsche Rossh's frühe 6
Herbstpflaume 32
" Schamal's 38

Herbst-Zeiberl rothes 59
Herrenpflaume 49
" gelbe 72
" neue 57
Heupflaume 29
Hohheitspflaume vom Monate August 54
Huling rothe prachtvolle 10
" wahre prachtvolle 27
Hyazinthpflaume 57

J.

Jefferson 48
Jerusalems-Pflaume gelbe 15
" " Jahn's gelbe 15
" " violette 12
Ikworth's incomparative 72
Jesum Erik 20
Inselpflaume grüne 17
Johannespflaume 49
Isabella 25
Jungferpflaume rothe 63
" weiße 42

K.

Kaiserin blaue 19
" dunkelblaue 22
" violette 25
" weiße 43
" weiße neue 62
Kaiserpflaume Mailändische 11
" ottomänische 40
" rothe 8
" violette 11
" " mit bunten Blättern 25
" weiße 41
Katharinen-Pflaume gelbe 43
" " mit bunten Blättern 39
Kirschpflaume gelbe 38
" rothe 33

Kirke's-Pflaume 31
Königin neue weiße 46
" Victoria Nro. I. 53
" " Nro. II. 25
" Vilvorde 72
Königspflaume 55
" Behren's 33
" blaue mit halbgefüllter Blüthe 31
" Diel's 54
" Firbas's 35
" frühe, rothe 54
" Haffner's 37
" Hauffer's 32
" Karl Koch's 56
" Keindl's violette 58
" Lallinger's 24
" Lucas's 54
" Nickitaer frühe 36
" Mayer's 55
" rothe süße 7
" Siebenfreund's 56
" von Tours 55
" von Trapp's 50

L.

M. Langhlin 72
Lavrence Early Red 72
" Favorite 72
Lieblingszwetsche Buel's 17
Lepine 30
Long Scarlet 72
Lucombé's Unvergleichliche 60

M.

Marillenpflaume 60
Maroko-Pflaume 24
Marunke gelbe 15
St. Martin 72
Meerstrandspflaume 32

Melniker-Zwetsche 21
Merveille de Neuyork 72
Mirabelle, aprikosenartige 39
" doppelte 60
" doppelte Ark's 40
" Bohn's gestreifte 48
" Flotow's früheste 59
" gelbe 60
" geperlte 43
" grüne 62
" Hofinger's rothe 53
" Rangheri's frühe, gelbe 39
" rothe 34
Monroë 39
Monstreuse d'Anglae-térrè 72
Muskateller schwarze 51

N.

Nektarine rothe 33

O.

Oktoberpflaume violette 59
Orleanspflaume Shmith's 59

P.

Perdrigon, bunter 47
" neuer 63
" rother 37
" später 52
" violetter 57
" weißer 41
Pflaume Agener 9
" " neue 5
" Bingham's 27
" aprikosenartige 43
" Braunauer aprikosenartige 42
" Brugnoller von Tours 31
" bunte 47
" Coë's rothgefleckte 16

Pflaume Coë's sehr späte rothe 59
" Cruger's 35
" von St. Etienne 43
" Freudenberger 35
" jaspisartige 46
" Kölnische 35
" von Mimms 9
" " Montfort 56
" Nolten's ungarische 8
" Norbert's 52
" ohne Stein 21
" Peter's große gelbe 61
" Shmith's Orleans 30
" Walther's 34
" Wangenheim's 2
" zweimal tragende 26
Pflaumenzwetsche Donauer's frühe 21
" Rodt's frühe große 24
Pomandre Plum 72
Pomeranzenzwetsche 16
Prinz von Wales 58
Procureur 56
Prune des Brucettés 72
Prunus austriaca 5
„ cerasifera 33
„ claudiana 45
„ cocomilia 40
„ domestica 6
„ grandissima 14
„ insititia 31
„ lutea 26
„ maritima 32
„ pubescens 53
„ Spinosa 53
„ Syriaca 60
Prünelle gelbe 15
Purpurzwetsche 7
" Dörrell's neue 8

Q.

Queen of Mother 72

R.

Reineclaude Diaphane 62
„ Gigne 46
„ d'October 72
„ d'Oullen's 72
Renklode Althan's rothe 72
„ Bavay's 46
„ Berlepsch's große grüne 45
Renklode blaue 56
„ Bleeker's gelbe 28
„ extra 46
„ frühe 45
„ frühe gelbe 39
„ gelbe mit halbgefüllter Blüthe 42
„ Gonné's grüne 46
„ große grüne 45
„ von Jodoigne 46
„ kleine grüne 46
„ Merold's gelbe 43
„ van Mons's 46
„ Oberdieck's rothe 72
„ deutsche 26
„ Prinzen's gelbe 39
„ „ Kaiser 35
„ „ rothe 34
„ rothe 23
„ Vasseur's 62
„ violette 37
Riesenzwetsche 21
Robe de Sergent 36
Roßpaucke große 38
Rudolf's-Pflaume 15

S.

Sämling Bullman's 72
„ Heinrich's 72

Sämling der Johannispflaume I. Gen. I. Baum 50
" " " " II. " 52
" " " " III. " 19
" Pond's 47
" von Nro. 411 72
Scanarda 13
Schlehdorn gemeiner 53
" grüner 62
" weichhaariger 53
Schlehenpflaume 31
Schöne des September 54
" von Riom 58
Schütterhaferin Firba's frühe 19
Schweizerpflaume 38
September=Damaszene 52
Sharp's Emperor 24
Sohn verlorner 63
Spätdamaszene Koch's gelbe 44
Späte von Chalons 59
Spätzwetsche gelbe 16
" Nickitaer 4
" Valaszky's 6
Spilling, doppelter 26
" gemeiner gelber 26
" katalonischer 25
" rother 6
Spitzpflaume 72
Spitzzwetsche 7
Standart of England 72

T.

Taubenherz rothes 54
Thomaspflaume 55
Topas 15
Traubenpflaume 28
Trauttenberg's Zuckersüße 34

U.

Unvergleichliche 6

V.

Valenciennes 57
Veleston black Gage 72

W.

Waran Erik 55
Washington 61
Washington Bolmer 72
" pourple 72
Waterloo-Pflaume 15
Weinpflaume blaue 32
" große, grüne 17
" grüne 44
Wildling von Shropshire 22

Z.

Zeiberl rothes 8
" weißes 46
Zuckerfüsse Trauttenberg's 34
Zuckerzwetsche große 20
" kleine 21
Zwetsche Bazalicza's große blaue 20
" Berlepsch's violette 10
" Bleeker's gelbe 27
" Brünner 22
" Burgunder 23
" Cooper's große rothe 3
" Dollauer 6
" Donauer's 2
" Dörrell's neue, große 3
" Frost's gelbe 13
" frühe englische 19
" " grüne 29
" gelbe 26
" gemeine 10
" " kleine 5
" graugrüne 29
" Gisborné's 26
" große blaue Nickitaer 2

Zwetsche große blaue von der Worms 4
" " englische 4
" grüne gestreifte 28
" Halkel's große 12
" Hartwiß's gelbe 14
" von Hervy 29
" holländische 17
" italienische 4
" " grüne 17
" kleine 8
" " grüne 18
" Liegel's 7
" Meierböcks rothe 23
" Melnicker 21
" Nickitaer große 2
" phiolenartige gelbe 16
" plattrunde 12
" Porsch's rothe 8
" Ransleben's 22
" Reizensteiner gelbe 27
" Rodt's blaue 22
" " frühe große 19
" rothe 23
" Ruben's Burgunder 10
" röthlich braune 13
" Schmidt's rothe 10
" siebenburger 5
" ungarische 20
" Wiesinger's 6
Zwillingspflaume Liegel's 35

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Liegel, Georg,

Vollständige Uebersicht aller von dem Verfasser kultivirten und in verschiedenen Werken beschriebenen Pflaumen mit ihren Charakteren

Regensburg 1861

Oecon. 1116 x
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10297291-5